

**DOMINGO DE MANHÃ**

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC  
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2023**

**MÉDICO (OTORRINOLARINGOLOGIA)**

**INSTRUÇÕES**

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
  - contém 40 (quarenta) questões;
  - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1\_08/05/2023 18:30:09



**POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**

**QUESTÃO 01** – De acordo com o disposto na Portaria nº 2.436/2017, a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos \_\_\_\_\_, de forma a \_\_\_\_\_ ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) equivalentes – associar a
- B) distintos – distinguir de
- C) discordantes – discernir entre
- D) contraditórios – distinguir e discernir entre
- E) incompatíveis – associar e ligar a

**QUESTÃO 02** – Em relação à Atenção Básica, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas.
- ( ) Ações de saúde que envolvem cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- ( ) As equipes assumem responsabilidade sanitária sobre território definido.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – F.

**QUESTÃO 03** – De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

- I. Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.
- II. Garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica.
- III. Inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.
- IV. Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica.

Qual estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 04** – Assinale a alternativa INCORRETA considerando o Estatuto da Pessoa Idosa (2003) e suas alterações.

- A) É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.
- B) Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social.
- C) Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas, gratuitamente, próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- D) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- E) É assegurado o direito a acompanhante à pessoa idosa internada ou em observação, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

**QUESTÃO 05** – Segundo o Estatuto do Idoso, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticados contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a qualquer dos seguintes órgãos:

- I. Conselho Municipal da Pessoa Idosa.
- II. Conselho Interfederativo da Pessoa Idosa.
- III. Conselho Estadual da Pessoa Idosa.
- IV. Defensoria Pública da Pessoa Idosa.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 06** – A respeito de indicadores de saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. Um indicador é uma variável, característica ou atributo de Estrutura, Processo ou Resultado, baseada em Donabedian (1980, 1990), que é capaz de sintetizar e/ou representar e/ou dar maior significado ao que se quer avaliar.
- II. O componente Estrutura inclui a relação entre categorias de recursos humanos existentes, tal como o número de agentes comunitários de saúde ou de profissionais de enfermagem.
- III. O componente Processo inclui a relação entre as atividades de distintos profissionais, tal como número de atividades sobre saúde reprodutiva realizadas para adolescentes no serviço de saúde ou número de primeira consulta ginecológica para gestantes.
- IV. Entre os componentes adotados na construção de um indicador, pode-se avaliar as relações que permitem a análise de quanto cada componente influencia o outro, tal como a relação estrutura/processo, avaliando a relação entre recursos existentes e a produtividade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 07** – A respeito da utilização da epidemiologia em saúde, considerando os termos comuns usados na interpretação da literatura médica para exames diagnósticos, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A probabilidade pós-teste é igual a chances pós-teste / (1 + chances pós-teste).
- ( ) Através de um nomograma, pode-se calcular a probabilidade pós-teste usando a probabilidade pré-teste e a razão de verossimilhança, sem ter que converter a probabilidade pré-teste em chances.
- ( ) A razão de verossimilhança negativa é a razão entre a probabilidade de um resultado negativo de exame entre pacientes sem a doença e a probabilidade de um resultado positivo entre pacientes com a doença.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

**QUESTÃO 08** – No campo da ética médica ou bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No estabelecimento de prioridades nas políticas públicas de saúde, os gestores têm utilizado balizamentos, entre eles, as bases epidemiológicas e demográficas, a vulnerabilidade do agravo, os recursos, a tecnologia disponível e a efetividade dos procedimentos.
- B) Como Norma Diceológica, é direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- C) Como Norma Diceológica, é direito do médico realizar a procriação medicamente assistida, desde que seja com o objetivo de criar embriões com a finalidade de escolha de sexo.
- D) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- E) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente.

**QUESTÃO 09** – Sobre a semiologia dos órgãos da audição e do equilíbrio, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A membrana timpânica é considerada normal quando sua coloração é perlácea, com uma região anterior que reflete a luz do otoscópio, chamada de triângulo luminoso de Politzer.
- B) O teste de Weber é um teste altamente sensível para perdas auditivas condutivas, porém não tão sensível para as Perdas Auditivas (PA) neurossensoriais leves.
- C) Nos indivíduos com audição normal, a via aérea é mais sensível à percepção sonora do que a via óssea. Nesses casos, ao teste de diapasão, o teste de Rinne será negativo.
- D) Na prova dos passos de Fukuda solicita-se que o paciente marche no lugar, com os olhos fechados, como se estivesse "andando sem sair do lugar". Estará alterado se o paciente realizar desvio do corpo maior que 45° para um dos lados ou deslocar-se por mais de um metro.
- E) HINTS é a sigla em inglês para três testes oculomotores: o teste do impulso cefálico (*Head Impulse Test*), nistagmo periférico típico (*Nystagmus*), e a pesquisa do desvio skew (*test for Skew deviation*).

**QUESTÃO 10** – Sobre a eletrococleografia, analise as assertivas abaixo:

- I. A principal indicação clínica da eletrococleografia é no diagnóstico da doença de Ménière.
- II. O exame costumeiramente é realizado com o estímulo do tipo clique, porém, estudos recentes preconizam a realização do exame com estímulo tipo *toneburst* de 500 Hz, 1.000 Hz e 2.000 Hz.
- III. Permite a obtenção da atividade eletrofisiológica do sistema auditivo, mapeando as sinapses das vias auditivas desde o nervo coclear, núcleos cocleares, complexo olivar superior na região da ponte, núcleo do lemnisco lateral até o colículo inferior em nível do mesencéfalo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 11** – Sobre os tumores glômicos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O principal diagnóstico diferencial dos tumores glômicos é com a artéria carótida interna ectópica.
- B) A biópsia pré-operatória é indispensável para um diagnóstico correto.
- C) São considerados tumores raros com uma incidência estimada de 1:1 milhão de habitantes.
- D) Zumbido pulsátil e perda auditiva são os sintomas mais precoces.
- E) O tratamento deve ser individualizado, levando em conta a idade do paciente, o ritmo de crescimento, as doenças associadas e as estruturas neurovasculares envolvidas.

**QUESTÃO 12** – São síndromes associadas à atresia de conduto auditivo externo, EXCETO:

- A) Microsomia hemifacial.
- B) Síndrome de Treacher-Collins.
- C) Sequência (síndrome) de Pierre-Robin.
- D) Síndrome otobranquiorenal.
- E) Síndrome de Marfan.

**QUESTÃO 13** – Paciente do sexo feminino, 35 anos, com queixa de hipoacusia bilateral progressiva há anos, apresenta à otoscopia uma pequena mancha avermelhada retrotimpânica na região do promontório. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Otosclerose.
- B) Presbiacusia.
- C) Colesteatoma.
- D) Labirintite.
- E) Surdez súbita.

**QUESTÃO 14** – Em relação à Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR), assinale a alternativa correta.

- A) O exame audiométrico em estágio inicial revela surdez neurosensorial pura, com um entalhe característico como um V, centrado em uma das frequências agudas: 250 ou 500 kHz.
- B) A surdez é irreversível e não evolutiva após cessação da exposição ao ruído.
- C) Os produtos de distorção acústica não são mais sensíveis que os limiares em audiometria tonal para avaliação precoce ligada à exposição do ruído.
- D) O ruído é mais nocivo quando sua intensidade é menos elevada.
- E) Tabagismo não é um fator agravante do risco de surdez profissional.

**QUESTÃO 15** – Sobre a ototoxicidade de medicamentos, analise as assertivas abaixo:

- I. A ingestão ou contato dessas substâncias em nível tóxico na gestação, pode contaminar o feto e causar a ototoxicidade fetal ou congênita, dependendo da permeabilidade da substância na barreira placentária.
- II. A cocleotoxicidade se apresenta como hipoacusia, zumbido e plenitude auricular.
- III. O exame de emissões otoacústicas é considerado um excelente instrumento para a monitoração e a detecção precoce da lesão, sendo mais indicadas as emissões otoacústicas por produtos de distorção.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 16** – Sobre a otite externa, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Preparações contendo gentamicina são efetivas, mas não devem ser administradas em pacientes com perfuração da membrana timpânica devido ao risco de ototoxicidade.
- ( ) O uso de antimicrobianos sistêmicos não é indicado em casos de celulite ou extensão do processo aos tecidos periauriculares.
- ( ) Entre os fatores de risco para otomicose estão diabetes melito, imunossupressão e cirurgia otológica prévia.
- ( ) A otalgia é o sintoma mais característico do estágio inflamatório agudo, podendo refletir-se em toda a região periauricular.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – V.
- B) V – F – V – V.
- C) F – F – V – V.
- D) F – V – F – F.
- E) V – F – V – F.

**QUESTÃO 17** – Entre os fatores de risco para otite média aguda recorrente, NÃO podemos incluir:

- A) Tabagismo passivo.
- B) Anormalidades craniofaciais.
- C) Idade maior de 09 anos.
- D) Predisposição genética.
- E) Frequentar a creche.

**QUESTÃO 18** – Sobre a perda auditiva congênita, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Citomegalovírus é a causa mais comum de surdez congênita nos Estados Unidos.
- B) Aproximadamente 50% das crianças nascidas com rubéola congênita sintomática apresentam perda auditiva.
- C) A infecção congênita por rubéola envolvendo a orelha interna geralmente resulta em perda auditiva unilateral leve.
- D) A maioria das infecções congênitas (>95%) pelo CMV é silenciosa, e o recém-nascido é aparentemente normal ao nascimento.
- E) Não há tratamento específico para rubéola congênita.

**QUESTÃO 19** – A respeito de surdez súbita, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A surdez súbita é definida como uma perda auditiva neurosensorial de, pelo menos, 30 dB em três frequências contíguas e instalada em até 72h.
- ( ) A perda auditiva é, na maioria dos casos, bilateral.
- ( ) Entre os sinais de mau prognóstico estão curvas audiométricas do tipo descendente ou plana, má discriminação vocal, perdas severas, acometimento em extremos de idade (ou seja, em crianças e idosos) e zumbido intenso.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V.
- B) F – V – F.
- C) V – V – V.
- D) F – F – F.
- E) V – F – F.

**QUESTÃO 20** – Sobre as perfurações timpânicas, analise as assertivas abaixo:

- I. As perfurações podem ser classificadas em centrais e periféricas.
- II. A timpanotomia com colocação de tubo de ventilação é o tratamento de escolha.
- III. O uso de Aparelhos de Amplificação Sonora Individuais (AASIs) são indicados para os pacientes com orelha média estável sem otorreia contínua com perda auditiva e que não queiram realizar procedimento cirúrgico.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

**QUESTÃO 21** – Em relação à presbiacusia, é correto afirmar que:

- A) O exame PEATE pode apresentar uma diminuição da latência em todas as ondas.
- B) Decorre do comprometimento combinado da função das vias auditivas centrais e periféricas, não havendo apenas o envolvimento coclear.
- C) A raça negra está associada à maior probabilidade de presbiacusia quando comparada com indivíduos brancos.
- D) Diabetes melito, dislipidemia e doenças cardiovasculares não são fatores de risco.
- E) A imitancimetria geralmente encontra-se dentro da normalidade, sendo a curva B de Jerger mais comum.

**QUESTÃO 22** – Sobre o implante coclear, analise as assertivas abaixo:

- I. Entre as indicações de colocação de implante coclear está a agenesia de nervo auditivo.
- II. Paciente com boa motivação para o processo de reabilitação e com expectativas adequadas quanto aos resultados terão maiores benefícios com o implante coclear.
- III. Paralisia facial, meningite e infecção do retalho estão entre as complicações cirúrgicas.
- IV. Pacientes com surdez pós-meningite apresentam uma melhor discriminação auditiva após colocação de implante coclear em comparação com outras causas de perda auditiva.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas IV.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) Apenas II, III e IV.

**QUESTÃO 23** – Paciente do sexo masculino, 22 anos, apresenta aumento de volume progressivo e doloroso em região retroauricular à direita e região cervical também à direita há 30 dias, acompanhado de otalgia e mal-estar. Ao exame físico, apresentava torcicolo. Realizada tomografia cervical com contraste de pescoço e mastoides revelando espessamento em ouvido médio e mastoide, além de extensa coleção na região cervical. Respectivamente, qual é a principal hipótese diagnóstica e tratamento de escolha?

- A) Abscesso de Bezold – Cirurgia e antibioticoterapia de amplo espectro.
- B) Abscesso parafaríngeo – Apenas antibioticoterapia.
- C) Petrosite – Cirurgia e uso de corticosteroides.
- D) Meningite – Apenas antibioticoterapia.
- E) Tromboflebite de seio sigmoide – Uso de anticoagulante.

**QUESTÃO 24** – Sobre o zumbido persistente, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O zumbido do tipo subjetivo é muito raro e é definido como a percepção de sons provenientes do próprio corpo.
- B) Audiometria tonal, vocal e imitancimetria devem ser realizadas em todos os pacientes.
- C) Exposição prolongada a ruído e trauma acústico são as causas mais prevalentes.
- D) Diuréticos de alça, aminoglicosídeos e anti-inflamatórios não esteroidais podem causar zumbido.
- E) Sempre que o zumbido for unilateral, deve-se solicitar exames complementares para avaliar a presença de lesão retrococlear.

**QUESTÃO 25** – Segundo as Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal do Ministério da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A Triagem Auditiva Neonatal deve ser realizada, preferencialmente, nos primeiros dias de vida (24h à 48h) na maternidade, e, no máximo, durante o primeiro mês de vida, a não ser em casos em que a saúde da criança não permita a realização dos exames.
- B) Para os neonatos e lactentes com indicador de risco utiliza-se o exame de Emissões Otoacústicas Evocadas.
- C) O registro das Emissões Otoacústicas Evocadas não possibilita a identificação de perdas auditivas retrococleares.
- D) O reteste deve ser realizado em ambas as orelhas, mesmo que a falha no teste tenha ocorrido de forma unilateral.
- E) Entre os indicadores de risco para deficiência auditiva está a preocupação dos pais com o desenvolvimento da criança, da audição, fala ou linguagem.

**QUESTÃO 26** – A VPPB do canal semicircular \_\_\_\_\_ é a mais comum (90% dos casos). Para o diagnóstico da VPPB dos canais verticais, utilizam-se as manobras de \_\_\_\_\_. A VPPB de Canais Laterais (CSL) ou horizontais corresponde a de 10% a 20% dos casos e o diagnóstico é realizado pela manobra de \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) anterior – Dix-Hallpike – Epley
- B) anterior – Gufoni – Dix-Hallpike
- C) anterior – Epley – girar de lado (*head roll test*)
- D) posterior – Dix-Hallpike – girar de lado (*head roll test*)
- E) posterior – girar de lado (*head roll test*) – Gufoni

**QUESTÃO 27** – Paciente do sexo masculino, 42 anos, chega à emergência com uma crise de vertigem intensa iniciada pela manhã do mesmo dia, associada à sudorese, palidez e vômitos. Não apresenta sintomas auditivos associados. Sem história de episódios de tonturas prévios. Ao exame físico, apresenta nistagmo espontâneo horizontal com fase rápida em direção ao lado saudável, respeitando as leis de Alexander e ao Head Impulse Test (HIT). Evidencia um RVO alterado quando o lado acometido é testado e um RVO normal ao ser testado o lado saudável. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) AVC hemorrágico.
- B) Doença de Ménière.
- C) Deiscência de canal semicircular superior.
- D) Neurite vestibular.
- E) Esclerose múltipla.

**QUESTÃO 28** – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os exames vestibulares às doenças periféricas.

**Coluna 1**

1. Video Head Impulse Test (VHIT).
2. Vestibular Evoked Myogenic Potential (VEMP).

**Coluna 2**

- ( ) Mede o Reflexo Vestíbulo-Ocular (RVO).
- ( ) Consegue avaliar cada um dos seis canais semicirculares de modo quase individualizado.
- ( ) Avalia a função do sáculo e do utrículo.
- ( ) Mede a intensidade da contração muscular do músculo esternocleidomastoideo e do músculo reto inferior.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 2 – 1 – 1.
- B) 2 – 1 – 2 – 1.
- C) 1 – 2 – 2 – 2.
- D) 1 – 2 – 1 – 2.
- E) 1 – 1 – 2 – 2.

**QUESTÃO 29** – Em relação ao aqueduto vestibular alargado, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Pode estar associado às anomalias cocleares como nas síndromes de Mondini, Pendred, Swartze, branquio-otorrenal e surdez ligada ao cromossomo X.
- B) Paciente pode apresentar perda auditiva desde a infância, que piora após trauma encefálico.
- C) Aumenta a predisposição a VPPB.
- D) O diagnóstico é confirmado através de TC quando o aqueduto for maior ou igual a 1,5 mm de diâmetro na sua porção média.
- E) Os tratamentos cirúrgicos para estabilização da doença, como *shunt* do saco endolinfático, a sua oclusão (Wilson) ou sua descompressão, são tratamentos de escolha.

**QUESTÃO 30** – Estão entre as causas de Paralisia Facial Periférica, EXCETO:

- A) Doença de Lyme.
- B) Ferimento por arma de fogo.
- C) Otite externa necrotizante.
- D) Sarcoidose.
- E) Síndrome de Fournier.

**QUESTÃO 31** Sobre a Paralisia de Bell, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O diagnóstico clínico de paralisia de Bell é feito por exclusão de outras possíveis causas.
  - II. Em gestantes, sua ocorrência é 3,3 vezes mais comum do que em não gestantes, sendo mais frequente no último trimestre ou logo após o parto.
  - III. Sintomas como hipoacusia ou vertigens costumam estar presentes.
  - IV. Entre os fatores de melhor prognóstico estão: paralisia completa, ausência de dor retroauricular e maior idade do paciente.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
  - B) Todas as assertivas estão incorretas.
  - C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
  - D) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
  - E) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

**QUESTÃO 32** – Sobre as neoplasias malignas de osso temporal, qual o tipo histológico mais comum?

- A) Carcinoma Espinocelular.
- B) Adenocarcinoma.
- C) Sarcoma.
- D) Melanoma.
- E) Carcinoma adenoide cístico.

**QUESTÃO 33** – Entre as opções de tratamento da Otite Média Aguda está a observação inicial por 72h sem o uso de antibiótico, qual dos pacientes abaixo poderia ser candidato à observação inicial?

- A) Paciente 5 meses e sem febre.
- B) Paciente 1 ano e otorreia.
- C) Paciente 2 anos e febre de 39,5°C.
- D) Paciente 3 anos e OMA unilateral.
- E) Paciente 18 meses e episódio de OMA há 20 dias.

**QUESTÃO 34** – Sobre o Schwannoma de VIII nervo, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Tumor benigno de crescimento lento que se origina, na maior parte das vezes, da divisão superior do nervo vestibular.
- B) Entre as indicações de radioterapia estão: paciente com mais de 65 anos e que não possa realizar cirurgia.
- C) Pode estar associado à neurofibromatose tipo 2.
- D) A audiometria tonal limiar mostra classicamente a perda auditiva do tipo neurosensorial unilateral.
- E) Diagnóstico precoce pode ser feito com RNM com gadolínio, mostrando uma lesão com pouco realce ao contraste em T1, podendo ser em formato de caracol.

**QUESTÃO 35** – Paciente do sexo masculino, 35 anos, vem à consulta com queixa de otorreia fétida em ouvido esquerdo há anos. Já realizou diversos tratamentos com antibióticos via oral e antibióticos tópicos sem melhora significativa do quadro. A otoscopia apresenta presença de acúmulo epitelial em região atical visualizada após a aspiração do conduto auditivo. Frente a esse quadro clínico, qual é a conduta mais adequada?

- A) Repetir o tratamento com gota otológica contendo gentamicina e corticoide.
- B) Orientar medidas de higiene otológica adequadas.
- C) Solicitar audiometria e TC para planejamento cirúrgico.
- D) Coletar secreção de conduto auditivo e encaminhar para cultura para antibioticoterapia adequada.
- E) Internação para cirurgia de urgência para prevenir complicações como meningite e abscesso cerebral.

**QUESTÃO 36** – Sobre a otite média com efusão, assinale a alternativa correta.

- A) Aleitamento materno é um fator de proteção.
- B) O diagnóstico padrão-ouro é a TC de mastoides sem contraste.
- C) A visualização de nível hidroaéreo à otoscopia representa um sinal de gravidade.
- D) A timpanometria apresenta uma curva de Jerger tipo A.
- E) O tratamento inicial é com antibioticoterapia, em casos de falha recomenda-se a miringotomia.

**QUESTÃO 37** – Sobre a otite externa necrotizante, analise as assertivas abaixo:

- I. Ocorre principalmente em pacientes diabéticos, idosos ou com alguma imunodepressão.
- II. O quadro clínico característico é otalgia associada à febre alta e persistente.
- III. Deve ser feita biópsia de rotina para descartar carcinoma espinocelular.
- IV. A Tomografia Computadorizada (TC) do osso temporal com contraste é o exame de imagem mais importante na avaliação da evolução.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 38** – Em relação à estenose óssea do canal auditivo externo, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

**Coluna 1**

- 1. Osteoma.
- 2. Exostose.

**Coluna 2**

- ( ) Tumor ósseo unilateral.
- ( ) Associado a banhos de imersão em águas geladas.
- ( ) Cresce na porção lateral do canal.
- ( ) Múltiplas lesões.
- ( ) Recidiva é rara.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 1 – 1 – 2 – 2.
- B) 1 – 2 – 2 – 1 – 2.
- C) 1 – 2 – 1 – 2 – 1.
- D) 2 – 1 – 2 – 1 – 1.
- E) 2 – 2 – 1 – 1 – 1.

**QUESTÃO 39** – Em relação às fraturas de osso temporal, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Fraturas longitudinais são as mais comuns em traumas fechados.
- B) Hipoacusia ocorre em praticamente todos os casos.
- C) Acidentes automobilísticos correspondem à principal causa.
- D) Sempre que houver paralisia facial completa está indicada a realização de Eletroneurografia (ENOG) para avaliar prognóstico.
- E) O tratamento de vertigens agudas é realizado com sedativos labirínticos e esteroides.

**QUESTÃO 40** – Sobre a Deiscência do Canal Semicircular Superior, analise as assertivas abaixo:

- I. A alteração típica da audiometria é uma leve perda auditiva condutiva associada à presença de reflexo normal.
- II. As deiscências de canal semicirculares são mais comuns no canal superior.
- III. O diagnóstico é confirmado por meio de tomografia computadorizada de ossos temporais de alta resolução.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.