



TUTOR MÉDICO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **09 (nove) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **50 (cinquenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 05 (cinco) questões, Conhecimentos SUS 15 (quinze) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **01 (uma) hora após seu início.**
- XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da prova. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo, para responder as questões 01 à 04:

Diferenciação entre os gêneros textuais: notícia e artigo de opinião.

Saber interpretar um texto, a partir do contexto de produção em que ele está inserido, é fundamental para a experiência cotidiana do leitor. A interpretação permite que saibamos diferenciar o conteúdo de uma notícia de jornal do de um artigo de opinião. Eles são gêneros textuais que nos propiciam a ter posturas diferentes quanto a suas leituras. Nesse ínterim, em teoria, no gênero textual **notícia**, não procuramos ler nas entrelinhas, pois as informações são factuais, não há linguagem subjetiva, não há duplo sentido. Já no gênero textual **artigo de opinião** é necessário saber ler nas entrelinhas, entender a linguagem subjetiva, entre outras estratégias de leitura que exigem posicionamento ativo na interpretação do que está escrito. Não podemos admitir que o teor de textos desse gênero seja formado de verdades absolutas.

Devemos estar atentos para o contexto em que o artigo de opinião foi produzido, a fonte, as imagens (se houver), o autor e a data de publicação são, inicialmente, dados importantes para começarmos a leitura consciente de um artigo de opinião. (Texto desenvolvido especificamente para esta prova)

1) Em relação à interpretação do texto analise as afirmativas abaixo:

- I. A postura do leitor de um artigo de opinião e de uma notícia deve ser a mesma, ou seja, as estratégias de leitura e o foco de qualquer gênero textual não diferem.
- II. Conhecer as especificidades dos dois gêneros textuais, notícia e artigo de opinião, auxilia na interpretação de seus conteúdos.
- III. O gênero textual artigo de opinião raramente impõe a leitura nas entrelinhas e nem se utiliza da linguagem subjetiva.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) III apenas.
- c) I e III apenas.
- d) II e III apenas.
- e) II apenas.

2) Analise o trecho abaixo extraído do texto:

“Saber interpretar um texto, a partir do contexto de produção em que ele está inserido, é fundamental para a experiência cotidiana do leitor”.

“Ele” é considerado na morfologia (01) _____. Na sintaxe, “Ele” se refere ao (02) _____. Já na linguística textual “Ele” se refere a (03) _____:

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) um pronome pessoal do caso oblíquo (pronome do objeto) - predicado; - coesão parcial.
- b) um pronome pessoal do caso reto (pronome do sujeito) - sujeito - coesão referencial.
- c) um pronome adjetivo possessivo - predicativo do sujeito - coesão por negação.
- d) um pronome do caso oblíquo (pronome do objeto) - adjunto adverbial de lugar - coesão referencial.
- e) um pronome pessoal do caso reto (pronome do sujeito) - sujeito - coesão parcial.

3) Analise o trecho abaixo extraído do texto:

“A interpretação permite que saibamos diferenciar o conteúdo de uma notícia de jornal do de um artigo de opinião”. Essa passagem é equivalente a: “A interpretação permite que saibamos diferenciar o conteúdo de uma notícia de jornal do CONTEÚDO de um artigo de opinião”.

Esse fenômeno, que faz parte das figuras de sintaxe ou de construção, é conhecido por _____. É uma figura de construção, que ocorre na estrutura da língua, quando há “a omissão de uma expressão facilmente subentendível na enunciação linguística” (Bechara, 2009, p.204).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Elipse.
- b) Pleonasma.
- c) Anacoluto.
- d) Haplologia sintática.
- e) Hipérbole.

4) **Leia o trecho do texto a seguir:**
Devemos estar atentos para o contexto em que o artigo de opinião foi produzido.
Em relação ao trecho apontado, analise as afirmativas abaixo.

- I. "Devemos estar atentos"- é uma estrutura de imperativo, pois impõe para "nós" que precisamos estar alertas.
- II. "Devemos estar atentos"- é uma estrutura formada pelo sujeito oculto identificado pela desinencial verbal "-mos".
- III. "para o contexto"- é o objeto indireto de "Devemos estar atentos".
- IV. "para o contexto"- é o complemento nominal de "atentos".

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) I e II apenas.
- c) II e IV apenas.
- d) II e III apenas.
- e) II apenas.

5) **Observe o exemplo a seguir e analise a alternativa que segue o mesmo padrão de colocação pronominal.**

Exemplo: "Ter-se-ia sido muito importante a leitura prévia de outros textos sobre características essenciais para um bom profissional. Após ler um deles, esforcei-me ao aplicar suas orientações no trabalho e não me importei com os comentários posteriores".

- I. Levar-te-ei os livros, comprei-os ontem e me entregaram hoje pela manhã.
- II. Iria te avisar sobre o livro raro, mas o enviaram para ser reformado ontem à noite.
- III. Diversos livros foram comprados e hoje estão se estragando nas prateleiras, se não fossem os leitores, os livros seriam descartados, afirmou-me a bibliotecária.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) I e II apenas.
- c) I e III apenas.
- d) II e III apenas.
- e) III apenas.

CONHECIMENTOS SUS

6) **Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, no que diz respeito às atribuições dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de controle de endemias (ACE), assinale a alternativa que contém uma atribuição comum a esses cargos.**

- a) Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente
- b) Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade
- c) Executar ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores
- d) Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares
- e) Executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças

7) **Considerando o Decreto 7508/2011 que regulamenta a lei 8080/1990, no que diz respeito a hierarquização da atenção no SUS, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Os serviços de Atenção Psicossocial terão acesso referenciado, não se incluindo entre as Portas de Entrada do SUS
- b) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço
- c) A população indígena contará com regimentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde
- d) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região
- e) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada, além das previstas no decreto 7508/2011, às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde

- 8) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. A Equipe de Atenção Primária (eAP), segundo a Política Nacional de Tenção Básica, poderá ser de duas modalidades. Na modalidade I: a carga horária mínima individual dos profissionais deverá ser de _____ horas semanais, com população adscrita correspondente a _____ % da população adscrita para uma equipe de Saúde da Família.
- 40; 100
 - 30; 75
 - 20; 50
 - 30; 100
 - 24; 60
- 9) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. *Atualmente, o conjunto de alterações de saúde causadas pelo vírus Zika é chamado de Síndrome Congênita associada à infecção pelo vírus Zika (SCZ). Todos os casos suspeitos ou confirmados de SCZ devem ser notificados no sistema _____*
- e-SUS Notifica - Módulo de Notificação Zika
 - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)
 - Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
 - e-SUS Atenção Primária
 - RESP-Microcefalia
- 10) “Reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável.”
Este texto diz respeito a um dos princípios do Humaniza SUS. Assinale a alternativa, que apresenta esse princípio.
- Corresponsabilidade
 - Autonomia dos sujeitos e coletivos
 - Indissociabilidade entre atenção e gestão
 - Transversalidade
 - Atenção centrada na pessoa
- 11) O índice de envelhecimento é um dos indicadores utilizados para a saúde. Acerca desse indicador, assinale a alternativa **incorreta**.
- Valores elevados desse índice indicam que a transição demográfica encontra-se em estágio avançado
 - Acompanhar a evolução do ritmo de envelhecimento da população, comparativamente entre áreas geográficas e grupos sociais é um dos seus usos
 - Não é utilizado para analisar variações geográficas e temporais na distribuição de idosos
 - Subsidiar a formulação, gestão e avaliação de políticas públicas nas áreas de saúde e de previdência social é um dos seus usos
 - Corresponde ao percentual de pessoas com 60 e mais anos de idade, na população total residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado
- 12) Quanto aos objetivos do Programa Saúde na Hora, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que apresenta os objetivos citados na portaria nº 397 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre o programa, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica.
- Ampliar a cobertura da Estratégia Saúde da Família.
 - Reduzir o volume de atendimentos de usuários com condições de saúde de baixo risco em unidades de pronto atendimento e emergências hospitalares.
 - Ampliar o acesso às ações e serviços considerados essenciais na Atenção Primária à Saúde.
 - Ampliar o número de usuários nas ações e nos serviços promovidos nas unidades de saúde da Família e unidades básicas de saúde.
- Estão corretas as afirmativas:**
- I, II, III e IV
 - II e III apenas
 - II, III e IV apenas
 - I e IV apenas
 - I, II e III apenas
- 13) A Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, institui o Programa Previne Brasil no âmbito do Sistema Único de Saúde. Essa prevê incentivos para ações estratégicas que contemplará o custeio de ações, programas e estratégias. Analise as ações e programas abaixo que assinale V (incentivo previsto na portaria) ou F (falsa, incentivo não previsto na portaria). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.
- () Equipe de Atenção Básica Prisional.
 () Programa Academia da Saúde.
 () Incentivo aos municípios com residência médica e multiprofissional.
 () Programa Saúde na Hora.
- V-V-V-F
 - V-V-V-V
 - V-V-F-F
 - V-F-V-F
 - F-V-F-V

14) O objetivo geral da Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (CaSAPS) é descrever, para a população, para os demais níveis do sistema, para os gestores e para os profissionais que atuam na Atenção Primária em Saúde (APS), a lista de ações e serviços clínicos e de vigilância em saúde ofertados no âmbito da APS brasileira. No item relativo à Atenção e Cuidados Centrados na Criança e no Adolescente, assinale a alternativa correta, que indica apenas ações e serviços que constam da aSAPS.

- Identificação, acompanhamento e atenção integral à adolescente gestante e puérpera e emissão de atestados médicos e laudos, incluindo declaração de óbito, quando solicitados e indicados
- Rastreamento e aconselhamento para uso abusivo de medicamentos e polifarmácia e acompanhamento da criança com microcefalia / zika vírus
- Manejo das doenças crônicas respiratórias mais prevalentes e suplementação nutricional quando indicada
- Prevenção, identificação e aconselhamento em relação ao uso abusivo de álcool e outras drogas e investigação de óbitos infantis e fetais em conjunto com a vigilância em saúde
- Atendimento de urgências/emergências para crianças e adolescentes e Ação coletiva de escovação dental supervisionada

15) Considerando a Lei Nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019, que institui o programa Médicos pelo Brasil, no âmbito da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), analise as ações e programas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- É prevista atividade de formação, durante a qual o candidato não perceberá qualquer remuneração.
- Haverá atividades de formação, na modalidade de curso, as quais serão supervisionadas por tutor médico.
- A lei de criação do programa considera locais de alta vulnerabilidade Municípios de pequeno tamanho populacional, baixa densidade demográfica e distância relevante de centros urbanos.
- Um dos objetivos do programa é valorizar os médicos da atenção primária à saúde, principalmente no âmbito da saúde da família.

Estão corretas as afirmativas:

- V-V-V-F
- V-V-V-V
- V-V-F-F
- V-F-V-F
- F-V-F-V

16) A Agência para Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde - Adaps, instituída pelo Decreto nº 10.283, de 20 de março de 2020, tem a seguinte estrutura: I - Conselho Deliberativo, Diretoria-Executiva e Conselho Fiscal. Com relação à representações que compõem o Conselho Deliberativo, analise as abaixo e assinale a alternativa que contém apenas representações definidas no Decreto de criação da Adaps.

- Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Federação Nacional dos Médicos
- Conselho Nacional de Saúde, Associação Médica Brasileira e Federação Médica Brasileira
- Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e Federação Médica Brasileira
- Conselho Federal de Medicina, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e Conselho Nacional de Residência Médica
- Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária

17) Considere a Portaria GM/MS Nº 3.353, de 2 de dezembro de 2021 que altera o Título IV da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre as regras para execução do Programa Médicos pelo Brasil. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta sobre a temática.

- O Distrito Sanitário Especial Indígena equiparase a município.
- Os municípios elegíveis para participação no Programa Médicos pelo Brasil serão definidos por meio de metodologia de priorização e elegibilidade estabelecida em ato específico da Agência para Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde – Adaps.
- Compete ao Ministério da Saúde definir os termos do contrato de gestão a ser firmado com a Agência para Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde – Adaps e seus aditivos, com a finalidade de execução do Programa Médicos pelo Brasil.
- Compete à Agência para Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde – Adaps definir e divulgar o quantitativo máximo de vagas destinadas aos municípios elegíveis.

Estão corretas as afirmativas:

- I, II, III e IV
- I e III apenas
- II, III e IV apenas
- I e IV apenas
- II e III apenas

- 18) De acordo com a Portaria GM/MS Nº 3.352, de 2 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a metodologia de priorização de municípios e de dimensionamento de vagas e define a relação dos municípios elegíveis e o quantitativo máximo de vagas no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, para a priorização dos municípios elegíveis são atribuídos pesos maiores a indicadores primários e menores a indicadores secundários. Assinale a alternativa correta que contém um indicador primário.
- População SUS – Dependente
 - Cobertura da Estratégia da Saúde da Família
 - Percentual da população vulnerável socioeconomicamente
 - Arrecadação *per capita* tributária
 - Internações por condições sensíveis à Atenção Primária em Saúde
- 19) Considere a Resolução nº 5, de 15 de outubro de 2021, que dispõe sobre o Contrato de Gestão para o desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde entre Ministério da Saúde (MS) e a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps). O Contrato de gestão deverá contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos do Ministério da Saúde e do Plano Nacional de Saúde relacionados à atenção primária. Assinale a alternativa que contém um objetivo que não é citado na resolução.
- Intensificações para a erradicação de doenças endêmicas como a tuberculose e a hanseníase
 - Aprimorar o subsistema de atenção integral à saúde dos povos indígenas
 - Fortalecer o monitoramento e avaliação de políticas públicas em saúde
 - Intensificar o acesso a vacinas, medicamentos e demais insumos estratégicos
 - Aprimorar a gestão integrada da rede de saúde
- 20) Os mecanismos e estratégias que organizam e regulam a descentralização como diretriz do SUS estabelecem instâncias de representação, monitoramento e pactuação política e administrativa envolvendo as três esferas de governo. Assinale a alternativa correta que apresenta todas essas instâncias.
- Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; Conselho Nacional de Secretários de Saúde; Comissão Intergestores Bipartite, Comissão Intergestores Tripartite e Conselhos de Saúde (Municipal Estadual e Nacional)
 - Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; Conselho Nacional de Secretários de Saúde; Comissão Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Tripartite
 - Comissão Intergestores Bipartite, Comissão Intergestores Tripartite e Conselhos de Saúde (Municipal Estadual e Nacional)
 - Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; Conselho Nacional de Secretários de Saúde; Comissão Intergestores Bipartite, Comissão Intergestores Tripartite, Conselhos e Conferências de Saúde (Municipal Estadual e Nacional)
 - Comissão Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Tripartite

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21) Considerando a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, assinale a alternativa que contém uma doença que não faz parte dessa lista.
- Malária na região amazônica
 - Doença de Chagas Crônica
 - Hepatite por vírus A
 - Leishmaniose Tegumentar Americana
 - Paracoccidiodomicose
- 22) Considerando as principais intervenções que previnem hipertensão arterial, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- () Cessação do uso de álcool em quem ingere álcool
- () Dieta rica em frutas, vegetais, grãos e baixo teor de gordura
- () Atividade física de resistência isométrica
- () Atividade física de resistência dinâmica
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
- V-V-V-V
 - F-V-V-V
 - V-V-F-F
 - V-F-V-F
 - F-V-F-V
- 23) A MAPA (monitorização ambulatorial da pressão arterial) e MRPA (monitorização residencial) são ferramentas importantes para a adequada avaliação da pressão arterial fora do consultório, com várias indicações comuns para esses métodos. Assinale a alternativa que apresenta uma indicação específica para a MAPA.
- Investigação de hipotensão postural e pós-prandial em pacientes não tratados e tratados
 - Confirmação do diagnóstico de hipertensão arterial (HA) resistente
 - Avaliação do controle da HA, especialmente em pacientes de alto risco cardiovascular
 - Indivíduos com resposta exacerbada da PA ao exercício
 - Pesquisa de HA mascarada
- 24) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. EFJ, 56 anos apresenta-se à consulta relatando variações em sua pressão arterial (PA) há cerca de 1 mês, a qual oscila entre 140-144 por 80-84 mmHg, em medidas domiciliares. Não faz uso de nenhum medicamento. Traz consigo exames realizados há cerca de 15 dias, que mostram LDL colesterol= 118 mg/dl, eletrocardiograma com sinais de discreta hipertrofia ventricular esquerda (índice Sokolow-Lyon = 36 mm). É tabagista ativo há mais de 30 anos. As medidas de PA à consulta variaram entre 146-148 x 92-96 mmHg. A conduta correta seria _____.
- medidas dietéticas e não farmacológicas apenas
 - medidas dietéticas e não farmacológicas e prescrever um betabloqueador cardio-seletivo
 - medidas dietéticas e não farmacológicas e prescrever um diurético tiazídico
 - medidas dietéticas e não farmacológicas e prescrever um inibidor da enzima de conversão da angiotensina associado a um diurético tiazídico
 - medidas dietéticas e não farmacológicas e prescrever um inibidor da enzima de conversão da angiotensina

- 25) O diabetes melito tipo 2 é uma das duas principais causas de doença renal crônica (DRC). Acerca das medidas de prevenção e controle da DRC em diabéticos tipo 2, assinale a alternativa correta.
- A prescrição de metformina deve ser evitada em pacientes com DRC/ cuja filtração glomerular seja menor que 45 ml/minuto/ 1,73 m²
 - Desde que pacientes com DRC são considerados de risco cardiovascular muito alto, o uso de aspirina deve ser estimulado em todos os pacientes com DRC
 - Para pacientes diabéticos, com albuminúria > 1 g/24 horas e hipertensão arterial a prescrição de um inibidor de enzima de conversão associado a um bloqueador do receptor da angiotensina é potencialmente útil
 - Para pacientes diabéticos com DRC com várias comorbidades, recomenda-se controle estrito da glicemia, tendo como alvo valores da hemoglobina glicada (A1C) ≤ 7%
 - Recomenda-se o tratamento de pacientes com diabetes melito tipo 2, DRC e filtração glomerular ≥ 30 ml / min por 1,73 m² com um inibidor do cotransportador sódio-glicose (SGLT2i) 2
- 26) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. De acordo com o calendário oficial recomenda-se que a 1ª dose da vacina pneumocócica 10 valente deve ser aplicada na idade de _____.
- 1 ano
 - 6 meses
 - 2 meses
 - 3 meses
 - 9 meses
- 27) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. A Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS) é orientada por alguns princípios. A ampliação do diálogo nas relações de cuidado e na ação educativa pela incorporação das trocas emocionais e da sensibilidade, propiciando ir além do diálogo baseado apenas em conhecimentos e argumentações logicamente organizadas é um desses princípios, qual seja _____.
- problematização
 - compromisso com a construção do projeto democrático e popular
 - emancipação
 - amorosidade
 - subjetivação
- 28) Sobre o suicídio e seus riscos na adolescência, assinale a alternativa **incorreta**.
- O suicídio está entre as 5 principais causas de morte entre adolescentes mais velhos (15 a 19 anos)
 - O uso nocivo do álcool é um fator de risco para o suicídio na adolescência
 - O abuso na infância é um fator de risco para sofrimento mental e suicídio na adolescência
 - A imensa maioria dos suicídios acontecem entre adolescentes que moram em países de renda média ou alta
 - As tentativas de suicídio podem ser impulsivas ou associadas a um sentimento de desesperança ou solidão
- 29) Sobre os critérios para rastreamento do diabetes melito tipo 2 em adultos assintomáticos, assinale a alternativa **incorreta**.
- Sobrepeso
 - História maternal de diabetes gestacional
 - História familiar de diabetes tipo 2 em parentes de 1º ou 2º grau
 - História maternal doença hipertensiva induzida pela gravidez
 - Presença de acantose nigricans
- 30) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Idosos saudáveis com poucas doenças crônicas coexistentes e função cognitiva e estado funcional preservado devem ter metas glicêmicas, com base na hemoglobina glicada (A1C) da ordem de _____.
- ≤ 7%
 - 7,5-8%
 - 7-7,5%
 - 7-8%
 - ≤ 6,5 %
- 31) Em relação aos métodos contraceptivos, assinale a alternativa que apresenta uma condição na qual o uso de contraceptivos hormonais combinados é totalmente **contraindicado**.
- Enxaqueca com aura
 - Epilepsia
 - Antecedente familiar de câncer de mama
 - Dislipidemia
 - Obesidade
- 32) Considerando as mais recentes Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST , assinale a alternativa correta.
- Creatinoquinase MB (CK-MB) massa e troponinas são os marcadores bioquímicos de necrose miocárdica de escolha
 - Uso de nitrato apenas em pacientes com risco intermediário e alto
 - Administrar betabloqueadores por via oral apenas a pacientes de risco intermediário e alto
 - Marcadores bioquímicos de necrose miocárdica devem ser mensurados em todos os pacientes com suspeita de síndromes coronarianas agudas sem supradesnível do segmento ST. Os marcadores devem ser medidos na admissão e repetidos pelo menos uma vez, 6 a 9h após o início dos sintomas, caso a primeira dosagem seja normal ou discretamente elevada
 - Em pacientes alérgicos a AAS, está indicada monoterapia inicial com inibidor P2Y12, com uso preferencial de ticagrelor ou prasugrel

- 33) Os betabloqueadores são medicações de grande utilidade para o tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Assinale a alternativa que apresenta todos os betabloqueadores recomendados pela diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida sintomática.
- Carvedilol e bisoprolol
 - Bisoprolol, carvedilol e succinato de metoprolol
 - Carvedilol, bisoprolol e propranolol
 - Bisoprolol, propranolol e succinato de metoprolol
 - Bisoprolol, carvedilol, propranolol, e succinato de metoprolol
- 34) Paciente masculino com escore de risco cardiovascular global (ERG) de 19%, tem como meta a redução de 53 mg/dl em seu LDL-colesterol. Vem fazendo uso de sinvastatina 10 mg/dia. Assinale a alternativa correta quanto à medicação a ser prescrita.
- Sinvastatina 40 mg /ezetimiba 10 mg/dia
 - Atorvastatina 20 mg/dia
 - Flavastatina 80 mg/dia
 - Pravastatina 80 mg/dia
 - Rosuvastatina 15 mg/dia
- 35) Mulher com 16 semanas de gestação apresenta quadro típico de escabiose. Assinale a alternativa correta que apresenta a medicação de primeira escolha para o caso.
- Ivermectina oral
 - Benzoato de benzila tópico
 - Monossulfiram tópico
 - Permetrina tópica
 - Deltametrina tópica
- 36) Sobre a varicela, assinale a alternativa correta.
- Inicia-se com febre alta, cefaleia, anorexia e vômito, podendo durar de horas até 7 dias
 - O tratamento específico da varicela é realizado por meio da administração do antiviral aciclovir, que é indicado para pessoas com risco de agravamento
 - As lesões comumente aparecem em surtos sucessivos de máculas que evoluem para pápulas, vesículas, pústulas e crostas. Tendem a surgir mais nas partes expostas do corpo, poupando o couro cabeludo, podendo ocorrer na nas membranas mucosas da boca e das vias aéreas superiores
 - A varicela está associada à síndrome de Reye, que ocorre especialmente em crianças e adolescentes que fazem uso do ácido acetilsalisílico (AAS) ou paracetamol durante a fase aguda
 - Dermatite herpetiforme não deve ser considerada como diagnóstico diferencial
- 37) Sobre as recomendações de antibioticoterapia para casos de doença meningocócica em criança, assinale a alternativa correta.
- Deverá ser feita somente com penicilina G cristalina
 - Poderá ser feita com penicilina G cristalina ou ceftriaxone
 - Poderá ser feita com penicilina G cristalina ou ampicilina
 - Deverá ser feita somente com ceftriaxone, pelos dados atuais de resistência bacteriana
 - Poderá ser feita com penicilina G cristalina, ampicilina ou ceftriaxone
- 38) Você recebe os seguintes resultados de testes para a pesquisa de marcadores sorológicos para hepatite B: HBsAg reagente e Anti-HBc total reagente. Assinale a alternativa correta quanto à interpretação e conduta.
- Início de fase aguda, repetir sorologia após 30 dias
 - Suscetível, indicar vacina ou pedir anti-HBs
 - Cura, solicitar Anti-HBs
 - Resultados não compatíveis, repetir sorologia após 30 dias
 - Hepatite aguda ou crônica, solicitar anti-HBc IgM
- 39) Paciente adulto de 64 anos de idade, diabético tipo 2, apresenta febre, diarreia com sangue, desidratação leve e comprometimento moderado do estado geral. Além das medidas de reposição hídrica, você prescreve ao paciente ciprofloxacino 500 mg duas vezes ao dia por 3 dias. Após o tratamento o paciente retorna com melhora do estado geral e de hidratação, mas mantém presença de fezes com sangue. Quanto à conduta, assinale a alternativa correta.
- Manter ciprofloxacino até o 7º dia
 - Manter apenas orientações sobre alimentação e hidratação
 - Prescrever sulfametoxazol-trimetropina (800/160 mg, 2 x dia) e descontinuar ciprofloxacino
 - Prescrever 2g de ceftriaxona, via intramuscular, uma vez ao dia, por pelo menos 2 dias e descontinuar ciprofloxacino
 - Manter ciprofloxacino até o 5º dia

- 40) Os geo-helmintos que causam maior carga de morbidade e para os quais existem técnicas de diagnóstico e medidas de controle comprovadamente viáveis são o *Ascaris lumbricoides*, o *Trichuris trichiura* e os ancilostomídeos *Ancylostoma duodenale* e *Necator americanus*. Sobre as geo-helmintíases, assinale a alternativa correta.
- Na maioria das vezes, as pessoas com geo-helmintíases são assintomáticas. Entretanto, altas cargas parasitárias e ocorrência de poliparasitismo podem desencadear manifestações clínicas severas
 - O homem adquire a ancilostomíase e a tricuriase mediante penetração ativa das larvas infectantes na pele íntegra do hospedeiro. A contaminação ocorre quando há contato direto com solo contaminado por fezes humanas
 - O homem adquire a ascaridíase e a infecção por *Necator americanus* mediante ingestão de ovos embrionados presentes em alimentos crus mal lavados ou pela ingestão de água contaminada, não tratada ou não filtrada
 - A prevalência e a intensidade de infecção por *A. lumbricoides* e *T. trichiura* comumente atingem níveis mais elevados entre os adultos, enquanto a ancilostomíase afeta mais crianças de 5 a 14 anos
 - O albendazol é a única medicação atualmente indicada para as geo-helmintíases
- 41) Sobre os esquemas terapêuticos recomendados para pacientes com hanseníase paucibacilar, assinale a alternativa correta.
- Adultos devem receber rifampicina: dose mensal de 600mg com administração supervisionada e clofazimina: dose mensal de 150mg com administração supervisionada e uma dose de 50mg autoadministrada em dias alternados
 - Adultos devem receber rifampicina: dose mensal de 600mg com administração supervisionada; dapsona : dose mensal de 100mg supervisionada e uma dose diária de 100mg autoadministrada e clofazimina: dose mensal de 300mg com administração supervisionada e uma dose diária de 50mg autoadministrada
 - Adultos devem receber rifampicina: dose mensal de 600mg com administração supervisionada e dapsona dose mensal de 100mg supervisionada e uma dose diária de 100mg autoadministrada
 - Crianças devem receber rifampicina: dose mensal de 450mg com administração supervisionada; dapsona : dose mensal de 50mg supervisionada e uma dose diária de 50mg autoadministrada e clofazimina: dose mensal de 150mg com administração supervisionada e uma dose de 50mg autoadministrada em dias alternados
 - Crianças devem receber rifampicina: dose mensal de 450mg com administração supervisionada e clofazimina: dose mensal de 150mg com administração supervisionada e uma dose de 50mg autoadministrada em dias alternados
- 42) Você atende um paciente com suspeita de tuberculose (TB) pulmonar que apresenta duas baciloscopias negativas e o teste rápido molecular para TB positivo. Assinale a alternativa correta que apresenta a conduta mais recomendada.
- Considerar paciente com TB
 - Considerar TB provável, iniciar esquema básico de tratamento e aguardar cultura e teste de sensibilidade
 - Considerar TB improvável, aguardar cultura e teste de sensibilidade
 - Encaminhar para referência de tuberculose independentemente do resultado da resistência à rifampicina
 - Repetir mais duas amostras de baciloscopia
- 43) Mulher de 62 anos que reside com a filha, diabética e está em tratamento para insuficiência cardíaca congestiva apresenta quadro clínico e radiológico compatível com pneumonia lobar à esquerda, sem derrame pleura. Apresenta febre baixa, está em regular estado geral, com glicemia capilar de 114 mg/dl e saturação e O₂ = 95% em ar ambiente. Fez uso, há cerca de um mês, de fosfomicina para tratamento de infecção urinária. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento indicado para o caso.
- Azitomicina via venosa em regime de internação
 - Azitromicina via oral em regime de internação
 - Ceftriaxone via intramuscular em regime ambulatorial
 - Levofloxacino por via venosa em regime de internação
 - Amoxicilina com clavulanato mais claritromicina por via oral, em regime ambulatorial
- 44) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. O tratamento de controle da asma é dividido em etapas de I a V, nas quais a dose de corticoide inalatório (CI) é aumentada progressivamente e/ou outros tratamentos de controle são adicionados. Para pacientes com idade ≥ 12 anos na etapa I do tratamento da asma, a prescrição preferencial é _____.
- Dose baixa de CI mais $\beta 2$ -agonista de curta duração por demanda
 - Dose baixa de CI apenas com aumento por demanda
 - Dose baixa de CI mais tiotrópio por demanda
 - Dose baixa de CI mais montelucaste
 - Dose baixa de CI mais formoterol por demanda
- 45) Após ter realizado exame citopatológico de rotina para detecção precoce do câncer cervical, uma paciente de 28 anos apresenta células atípicas de origem indefinida, não se podendo afastar lesão de alto grau. Assinale a alternativa que indica a conduta correta para o caso.
- Repetir a citologia em 6 meses
 - Colposcopia
 - Repetir a citologia de imediato
 - Biópsia cervical
 - Repetir a citologia em 3 meses

46) As situações de exposição ao HIV constituem atendimento de urgência, em função da necessidade de início precoce da profilaxia. No entanto, esta deve ser indicada a partir de critérios já estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta quanto a esses critérios.

- I. O tipo de material biológico é de risco para transmissão do HIV.
- II. O tipo de exposição é de risco para transmissão do HIV.
- III. O tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento é menor que 48 horas.
- IV. A pessoa exposta é não reagente para o HIV no momento do atendimento.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e IV apenas
- b) I e III apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) IV apenas
- e) I, II, III e IV

47) Considerando as tecnologias ou ações avaliadas para a detecção precoce do câncer de mama, assinale a alternativa que contém uma tecnologia ou ação recomendada pelo Ministério da Saúde para mulheres com risco padrão de desenvolvimento desse câncer.

- a) Ultrassonografia
- b) Ressonância Nuclear Magnética
- c) Rastreamento com mamografia em mulheres com idade entre 60 e 69 anos
- d) Termografia
- e) Ensino do autoexame das mamas

48) A triagem neonatal a partir da matriz biológica, “teste do pezinho”, é um conjunto de ações preventivas, responsável por identificar precocemente indivíduos com doenças metabólicas, genéticas, enzimáticas e endocrinológicas, para que estes possam ser tratados em tempo oportuno, evitando as sequelas e até mesmo a morte. Sobre o “teste do pezinho”. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Recomenda-se que o período ideal de coleta da primeira amostra, para recém-nascidos normais, esteja compreendido entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê
- () O uso de esteroides pela mãe não interfere nos resultados do teste
- () Em casos de mães com hipotireoidismo tratado e bem controlado não gestação, não há interferência no resultado do teste
- () Deficiência de Biotinidase não é uma das doenças diagnosticáveis a partir do teste

Estão corretas as afirmativas:

- a) V-V-V-V
- b) F-V-V-V
- c) V-V-F-F
- d) V-F-V-F
- e) F-V-F-V

49) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. O sopro de ramos pulmonares é um sopro inocente que ocorre com frequência em recém-nascidos, principalmente nos prematuros e naqueles com baixo peso ao nascer. Origina-se de uma hipoplasia relativa dos ramos pulmonares direito e esquerdo. É melhor auscultado na borda esternal esquerda alta, sendo ejetivo, sistólico, de baixa intensidade e irradiando-se para os lados direito e esquerdo do tórax, axilas e dorso. Um diagnóstico diferencial importante desse sopro é _____.

- a) Comunicação interatrial
- b) Estenose pulmonar
- c) Comunicação interventricular
- d) Persistência do canal arterial
- e) Valva aórtica bivalvular

50) Sobre os sinais de violência sexual em crianças e adolescentes, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Lesões de palato ou de dentes anteriores
- II. Sangramento vaginal em pré-púberes, excluindo a introdução de corpo estranho pela própria criança
- III. Infecção sexualmente transmissível
- IV. Sangramento ou fissuras anais de qualquer natureza

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III apenas
- b) II, III e IV apenas
- c) IV apenas
- d) I, II, III e IV
- e) I, II e III apenas