



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

ESTADO DE SÃO PAULO

Concurso Público

### 009. PROVA OBJETIVA

Técnico em Enfermagem

(Cód. 012)

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_



LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira para responder às questões de números 01 e 02.



(Bill Watterson. O melhor de Calvin. <http://cultura.estadao.com.br/quadrinhos>. 05.01.2018)

01. Uma interpretação correta da tira está em:

- (A) A família do garoto vê menos TV que a média, pois passa pouco tempo em casa.
- (B) O garoto cita uma pesquisa e consegue persuadir o pai a deixá-lo ver TV das 15:00 às 22:30.
- (C) O garoto insiste que os pais lhe façam companhia para ver TV depois da escola.
- (D) O pai proíbe o filho de ver TV nos dias de aula, mesmo que seja por um curto período.
- (E) O pai do garoto não o autoriza a ver TV por sete horas e meia ininterruptamente.

02. Ao se empregar o pronome **nós** no lugar de **a gente** na frase do último quadrinho – Você quer que a gente fique abaixo da média? –, a forma verbal **fique** deve ser substituída, conforme a norma-padrão da língua, por

- (A) fiquemos.
- (B) ficamos.
- (C) ficarmos.
- (D) ficaríamos.
- (E) ficássemos.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 07.

*Ex-vice-presidente do Facebook critica redes sociais*

Ao falar em uma palestra nos Estados Unidos, Chamath Palihapitiya, ex-vice-presidente de crescimento do Facebook, criticou o efeito causado pelas redes sociais.

Ele sugere que as curtidas e outros tipos de interação automática são voltados para a sensação de gratificação de curto prazo, e não geram conversas entre as pessoas. Palihapitiya diz usar o mínimo possível o Facebook e não permite que seus filhos acessem a plataforma. Apesar das palavras duras, ele **ameniza** o discurso dizendo que a empresa faz o bem no mundo.

Ao *site* Futurism, Lizbeth M. Kim, candidata a doutorado em psicologia social na Universidade Estadual da Pensilvânia, diz que a mensagem de Palihapitiya é importante para nos lembrar de algo que normalmente ignoramos por escolha. Estudos indicam que passar muito tempo usando redes sociais pode levar à depressão.

(Lucas Agrela. <https://exame.abril.com.br/>. 06.01.2018. Adaptado)

03. Segundo Chamath Palihapitiya, a interação característica das redes sociais

- (A) faz com que as pessoas se comuniquem por meio de gírias.
- (B) impossibilita as pessoas de praticarem atos de bondade.
- (C) torna as pessoas mais hostis na interação presencial.
- (D) não favorece o diálogo produtivo entre as pessoas.
- (E) não oferece às pessoas a chance de sentirem prazer.

04. Um sinônimo para **ameniza**, em destaque no segundo parágrafo, é

- (A) enfatiza.
- (B) demonstra.
- (C) abranda.
- (D) esclarece.
- (E) anula.

05. Uma palavra empregada com sentido figurado está destacada em:

- (A) falar em uma **palestra** (1º parágrafo).
- (B) sensação de **gratificação** (2º parágrafo).
- (C) palavras **duras** (2º parágrafo).
- (D) psicologia **social** (3º parágrafo).
- (E) normalmente **ignoramos** (3º parágrafo).

06. De acordo com a norma-padrão de pontuação, o vocábulo do trecho – ... a mensagem de Palihapitiya é importante para nos lembrar de algo que normalmente ignoramos por escolha. – que poderia estar entre vírgulas é:

- (A) importante.
- (B) algo.
- (C) que.
- (D) normalmente.
- (E) ignoramos.

07. A expressão destacada em – ... passar muito tempo usando redes sociais pode **levar à** depressão. – está corretamente substituída, com o sentido preservado e conforme as regras de regência da norma-padrão, por

- (A) resultar na.
- (B) decorrer da.
- (C) provocar da.
- (D) originar na.
- (E) reverter da.

Leia o texto para responder às questões de números 08 e 09.

#### *A China*

Quem não está admirado com o milagre da China está apavorado. Não dá para pensar na China sem se entusiasmar ou se assustar.

Dentro de muito pouco tempo, vai acontecer o seguinte: a China vai tornar o resto do mundo supérfluo. Não vai ser preciso existir mais ninguém, de tanto que vai existir a China.

O nosso destino é, enquanto a China cresce, irmos ficando cada vez mais desnecessários. Em... o quê? Vinte anos?

A China terá o maior parque industrial, com a mão de obra mais abundante e, portanto, mais barata, da Terra, e produzirá de tudo para o maior mercado consumidor da Terra, que será qual? O dos chineses, mesmo ganhando pouco.

A China concentrará toda a atividade econômica do planeta entre as suas fronteiras. A China se bastará.

(Luis Fernando Verissimo. <http://noblat.oglobo.globo.com/>. 26.10.2017. Adaptado)

08. Considere a forma verbal destacada no trecho:

Dentro de muito pouco tempo, **vai** acontecer o seguinte: a China **vai** tornar o resto do mundo supérfluo. Não **vai** ser preciso existir mais ninguém, de tanto que **vai** existir a China.

O autor emprega a forma verbal em destaque para

- (A) relatar um fato ocorrido recentemente.
- (B) fazer conjecturas sobre o futuro.
- (C) expressar seu súbito entusiasmo.
- (D) descrever o instante atual como incerto.
- (E) referir-se a eventos improváveis de acontecer.

09. No trecho – ... com a mão de obra mais abundante e, **portanto**, mais barata, da Terra... –, o vocábulo em destaque apresenta a mão de obra barata como

- (A) a razão para haver trabalhadores em abundância.
- (B) a condição que garante a abundância de trabalhadores.
- (C) uma consequência da abundância de trabalhadores.
- (D) um entrave ao fato de haver trabalhadores em abundância.
- (E) uma situação sem relação com a abundância de trabalhadores.

10. A concordância está em conformidade com a norma-padrão na frase:

- (A) A mão de obra é abundante e os salários não são muito altos na China.
- (B) O autor receia que os demais países se tornem supérfluo diante da China.
- (C) O milagre da China tem deixado muitas pessoas extremamente preocupada.
- (D) As transações econômicas mais relevantes do planeta deve ocorrer na China.
- (E) Os operários na China tende a produzir mercadorias para eles próprio consumir.

11. Em um escritório, foram organizados 200 processos, e constatou-se que 8% deles já estavam concluídos. Dos demais processos, 25% estavam parados, pois faltavam alguns documentos, e os processos restantes estavam em andamento. Em relação ao número total de processos que foram organizados, os que estavam em andamento representavam
- (A) 58%.  
(B) 62%.  
(C) 65%.  
(D) 69%.  
(E) 74%.
12. Em uma pesquisa feita com 600 jovens, constatou-se que a razão entre o número de jovens que trabalham e estudam e o número de jovens que só estudam é  $\frac{1}{3}$ . Se 10 jovens que só estudam também começarem a trabalhar, a razão entre o número de jovens que trabalham e estudam e o número de jovens que só estudam passará a ser de
- (A)  $\frac{2}{11}$   
(B)  $\frac{4}{11}$   
(C)  $\frac{6}{11}$   
(D)  $\frac{8}{11}$   
(E)  $\frac{10}{11}$
13. Uma pessoa comprou determinado número de caixas para empacotar livros que serão doados, e irá colocar em cada caixa o mesmo número de livros. Se forem colocados 25 livros em cada caixa, 4 livros ficarão de fora, mas, se forem colocados 22 livros em cada caixa, será necessário comprar mais uma caixa, e, desse modo, todos os livros ficarão empacotados. O número total de livros que serão doados é
- (A) 150.  
(B) 152.  
(C) 154.  
(D) 156.  
(E) 158.


14. Uma impressora gasta exatamente 7 minutos para imprimir 3 documentos A, B e C. A tabela mostra o tempo gasto na impressão dos documentos A e B.

Documento	Tempo
A	2 minutos e 30 segundos
B	3 minutos e 5 segundos
C	?

O tempo gasto na impressão do documento C foi


- (A) 2 minutos e 20 segundos.  
(B) 2 minutos e 05 segundos.  
(C) 1 minuto e 40 segundos.  
(D) 1 minuto e 25 segundos.  
(E) 1 minuto e 10 segundos.
15. Uma escola comprou blocos de anotações, cada um por R\$ 2,50, e canetas, cada uma por R\$ 3,50. Sabendo que entre blocos e canetas foram compradas 65 unidades e que o valor total dessa compra foi R\$ 187,50, então o número de blocos comprados foi
- (A) 40.  
(B) 38.  
(C) 35.  
(D) 32.  
(E) 30.
16. Em determinado setor de uma empresa, trabalham 7 funcionários, cuja média das idades é 31 anos, e a idade do mais velho é o dobro da idade do mais novo. Desconsiderando-se as idades do mais velho e do mais novo, a média das idades dos demais funcionários é 31,4 anos. A idade do funcionário mais velho é
- (A) 48.  
(B) 46.  
(C) 44.  
(D) 42.  
(E) 40.

17. Em um mesmo lado de uma avenida plana, há duas farmácias, A e B, distantes entre si 2,4 km, uma padaria P e uma livraria L, conforme mostra a figura.



Sabendo que a distância entre A e P é  $\frac{4}{5}$  da distância entre P e L, e que a distância entre L e B é 600 m, então, a distância entre P e B é


- (A) 1,8 km.
  - (B) 1,6 km.
  - (C) 1,4 km.
  - (D) 1,2 km.
  - (E) 1,0 km.
18. Um terreno retangular ABCD, com 50 m de comprimento, terá 40% de sua área destinada à construção de um pomar, também retangular, com 30 m de comprimento, conforme mostra a figura a seguir.



Sabendo que a área do pomar é  $600 \text{ m}^2$ , é correto afirmar que a medida do segmento  $\overline{PB}$  é

- (A) 10 m.
- (B) 15 m.
- (C) 20 m.
- (D) 25 m.
- (E) 30 m.

19. Uma praça quadrada e um terreno retangular têm suas medidas, em metros, indicadas nas figuras a seguir.



Figuras fora de escala

Sabendo que o perímetro do terreno é o dobro do perímetro da praça, então o perímetro do terreno é

- (A) 128 m.
- (B) 130 m.
- (C) 132 m.
- (D) 134 m.
- (E) 136 m.

20. A figura a seguir mostra as dimensões, em centímetros, de um prisma reto de base retangular.





Figura fora de escala

Sabendo que o volume desse prisma é  $240 \text{ cm}^3$ , então o maior lado da base, indicado na figura por  $3x$ , mede

- (A) 4 cm.
- (B) 8 cm.
- (C) 12 cm.
- (D) 16 cm.
- (E) 20 cm.

**R A S C U N H O**

21. Considere a imagem a seguir, extraída do MS-Word 2010, em sua configuração padrão. A primeira frase do parágrafo foi selecionada pelo usuário.



No contexto apresentado na imagem, quando o usuário utilizar o atalho de teclado  $\text{Ctrl}+\text{X}$ , a frase selecionada será

- (A) duplicada no parágrafo.
- (B) enviada para impressão.
- (C) recortada e colocada na área de transferência.
- (D) localizada no documento inteiro.
- (E) alinhada à direita.

22. Para responder à questão, utilize a planilha a seguir, extraída do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão. O desempenho de 4 alunos é apresentado em 3 notas na planilha, e a coluna E é um cálculo dessas notas. A célula E2 é um cálculo das células B2, C2 e D2, por exemplo.

	A	B	C	D	E
1	Nome	Nota 1	Nota 2	Nota 3	M
2	Carlos	8	7	6	7
3	Andrea	6	6	6	6
4	Paula	8	9	10	9
5	Daniel	5	10	6	

Assinale a alternativa que contém a fórmula que, ao ser inserida na célula E5, mantém o mesmo tipo de cálculo apresentado nas células E2, E3 e E4 em relação às notas.

- (A) =SOMA(B2:D5)
- (B) =SOMA(B5:D5)
- (C) =MÁXIMO(B5:D5)
- (D) =MÍNIMO(B5:D5)
- (E) =MÉDIA(B5:D5)

23. Considere a figura a seguir, extraída do MS-Outlook 2010, em sua configuração padrão, que mostra os cinco destinatários de um e-mail (Carlos, Clara, Pedro, Ana e Beatriz) pronto para ser enviado.

Enviar	Para...	carlos@gmail.com; clara@gmail.com
	Cc...	pedro@gmail.com
	Cco...	ana@gmail.com; beatriz@gmail.com
	Assunto:	Notícias sobre o trabalho

Assinale a alternativa que contém os nomes dos destinatários que receberão uma cópia do e-mail, mas não terão os seus endereços vistos pelos outros destinatários.

- (A) Carlos e Clara.
- (B) Carlos, Clara e Pedro.
- (C) Pedro, Ana e Beatriz.
- (D) Ana e Beatriz.
- (E) Carlos, Clara, Pedro, Ana e Beatriz.


24. Observe os ícones a seguir, extraídos do Windows Explorer do MS-Windows 7, na configuração de exibição de Ícones Médios. Os ícones foram marcados de 1 a 5 e não foram modificados desde a sua criação.



Assinale a alternativa que contém o número correspondente ao ícone de um atalho de uma pasta que não está vazia.

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

25. Considere a imagem a seguir, extraída do MS-Windows 7, em sua configuração padrão. Ela apresenta parte dos programas da pasta Acessórios, do Menu Iniciar > Todos os Programas.



Assinale a alternativa que contém o nome do aplicativo destinado a criar, colorir e editar imagens.

- (A) Paint.
- (B) Prompt de Comando.
- (C) Bloco de Notas.
- (D) WordPad.
- (E) Windows Explorer.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. No início do plantão, ao ler a evolução de enfermagem de um paciente sob seus cuidados, o técnico de enfermagem constatou que fora instalado um dispositivo para infusão de medicação na veia cefálica, que se localiza

- (A) na face anterior do tórax.
- (B) na região inguinal.
- (C) no peito do pé.
- (D) na face anterior do pescoço.
- (E) na face anterior do braço.

27. A prescrição médica é:

Penicilina cristalina 400.000 UI; }  
Soro fisiológico 50 mL; }  
Correr em 30 minutos, por via endovenosa.

Para o preparo da medicação, o técnico de enfermagem utilizou um frasco de penicilina cristalina com 5.000.000 UI, 8 mL de água destilada e um equipo de microgotas. Após diluição, o volume (V), em mililitros, de penicilina cristalina que deve ser acrescentado ao soro fisiológico e o gotejamento da solução (G), em microgotas por minuto, são, correta e respectivamente,

- (A) V = 0,8; G = 34.
- (B) V = 0,8; G = 101.
- (C) V = 0,65; G = 34.
- (D) V = 6,5; G = 34.
- (E) V = 8,0; G = 101.

28. Considere o processo de desinfecção de alto nível com glutaraldeído 2%, e assinale a alternativa correta.

- (A) Por ser corrosivo, o uso desse produto é contraindicado para a desinfecção de materiais que possuem partes metálicas e instrumental cirúrgico.
- (B) Para garantir a ação desinfetante de alto nível, a solução deve ser trocada diariamente.
- (C) Após sua ativação, a solução requer a exposição de materiais por cinco minutos para se obter o efeito de desinfecção de alto nível.
- (D) Após a desinfecção, os produtos expostos ao glutaraldeído 2% devem ser enxaguados com água estéril.
- (E) O uso de luvas de procedimentos e máscara cirúrgica protege o trabalhador e evita os danos à saúde, decorrentes da exposição aos vapores da solução de glutaraldeído 2%.

29. O técnico de enfermagem está preparando a unidade para receber um paciente em pós-operatório mediato de safenectomia em membro inferior direito. Considerando-se essa situação, ele deve providenciar para que

- (A) a cabeceira do leito fique elevada.
- (B) existam coxins, em quantidade suficiente, para manter o paciente em decúbito lateral esquerdo.
- (C) o pé do leito fique elevado.
- (D) o paciente seja mantido em posição de Fowler.
- (E) existam coxins, em quantidade suficiente, para manter o paciente em decúbito lateral direito.

Para responder às questões de números 30 a 32, considere o relato a seguir.

R.A., 67 anos, masculino, hipertenso, portador há 12 anos de diabetes tipo 2, em uso de insulina há 15 dias, compareceu, acompanhado pela filha, à unidade de saúde da família para avaliação. No acolhimento, relatou estar com fome e queixou-se de tontura, fraqueza e dor de cabeça. Apresentava-se apreensivo, com sudorese e tremores. Informou, que há cerca de duas horas, sua filha havia administrado a dose de insulina NPH prescrita pelo médico, e que, por estar atrasado, não havia tomado o café da manhã, trazendo consigo um lanche de pão e queijo para comer enquanto aguardava a consulta. Ao aferir seus sinais vitais, o técnico de enfermagem obteve: T = 36,6 °C; R = 16 respirações por minuto; P = 102 batimentos por minuto e P.A = 142 X 88 mmHg. Durante o atendimento, a filha do usuário informou estar com dúvidas a respeito dos cuidados com a insulina.

30. Frente aos sinais e sintomas apresentados, o técnico de enfermagem deve solicitar a presença do enfermeiro ou médico, suspeitando tratar-se de um caso de

- (A) cetoacidose diabética.
- (B) hipoglicemia.
- (C) hiperglicemia.
- (D) vasculopatia diabética.
- (E) hipertensão súbita.

31. Ao realizar as orientações sobre o armazenamento do frasco de insulina em uso, o técnico de enfermagem deve esclarecer que

- (A) o frasco pode ser mantido em temperatura ambiente para minimizar dor no local da injeção, entre 15 °C e 30 °C.
- (B) após uma semana do início do uso, a insulina perde sua potência, e o frasco deve ser descartado em lixo comum.
- (C) o frasco deve ser mantido no congelador, sendo retirado apenas uma hora antes do momento da aplicação da dose prescrita.
- (D) o medicamento deve ser mantido no freezer, dentro de uma caixa de isopor, para evitar seu congelamento.
- (E) em viagens de avião, não sendo necessária a aplicação da insulina, o frasco em uso deve ser despachado junto com a bagagem.

- 32.** Para a obtenção de resultado fidedigno, ao mensurar a pressão arterial de R.A., o técnico de enfermagem deve observar, entre outros itens, que o usuário diabético sob risco de hipotensão ortostática
- (A) esteja sentado, com o braço apoiado e à altura do ombro.
  - (B) não tenha ingerido chá ou café, nos últimos cinco minutos antes do procedimento.
  - (C) tenha, pelo menos, 50% do diâmetro de seu braço envolvido pela câmara inflável do equipamento utilizado para a aferição.
  - (D) esteja em repouso, há três minutos, antes do procedimento.
  - (E) não tenha fumado nos últimos dez minutos.
- 33.** No Brasil, como estratégia para o controle da tuberculose, o Ministério da Saúde preconiza a busca ativa de sintomáticos respiratórios, uma vez que esta permite a detecção precoce das formas pulmonares. Para tanto, na população geral, deve-se considerar como sintomático respiratório aquele que apresenta
- (A) febre e tosse há, pelo menos, cinco dias.
  - (B) tosse, por tempo igual ou superior a três semanas.
  - (C) tosse acompanhada de expectoração amarelada, há, pelo menos, três dias.
  - (D) febre superior a 38 °C, dor no tórax e tosse seca por tempo igual ou superior a sete dias.
  - (E) tosse, por tempo igual ou superior a cinco dias.
- 34.** Durante a realização de um grupo educativo para gestantes, algumas participantes se queixaram de flatulência e desejavam saber como evitar ou melhorar esse desconforto. Frente a essa situação, o técnico de enfermagem deve orientar
- (A) a aplicação de compressas mornas no baixo ventre e repouso com os membros inferiores elevados, após as refeições.
  - (B) a ingestão de medicação antiemética, três vezes ao dia, até a melhora dos sintomas.
  - (C) o fracionamento da dieta em até seis refeições por dia, e evitar a ingestão de frutas cítricas.
  - (D) a ingestão de dieta pobre em verduras, mamão, ameixas e cereais integrais.
  - (E) o aumento na ingestão de líquidos, e evitar alimentos de alta fermentação, tais como: ovo, feijão, leite e açúcar.
- 35.** Ao administrar os medicamentos prescritos para uma puérpera, cujo parto normal ocorrera há seis horas, o técnico de enfermagem aproveitou a oportunidade para averiguar a contração uterina e as características dos lóquios. Deve-se considerar normal a presença de útero
- (A) contraído, na altura da sínfise púbica e lóquios de cor castanha-avermelhada.
  - (B) flácido, acima da cicatriz umbilical e lóquios de cor rubra.
  - (C) contraído, um pouco abaixo da cicatriz umbilical e lóquios de cor vermelha.
  - (D) com consistência pastosa, abaixo da cicatriz umbilical, e lóquios de cor amarela-esbranquiçada.
  - (E) flácido, pouco acima da sínfise púbica, e lóquios de cor vermelho-vivo.
- 36.** Ao participar junto à equipe de saúde de atividades educativas sobre planejamento familiar, o técnico de enfermagem deve esclarecer que
- (A) a mulher que utiliza a pílula combinada (anticoncepcional hormonal oral combinado) como método anticoncepcional deve informar o seu uso sempre que for a qualquer consulta, mesmo que isso não lhe seja perguntado.
  - (B) a laqueadura tubária e a vasectomia são os únicos métodos anticoncepcionais totalmente eficazes.
  - (C) o uso conjunto da camisinha feminina com a camisinha masculina promove, ao mesmo tempo, a prevenção da gravidez e a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV/Aids.
  - (D) o uso do dispositivo intrauterino (DIU) é contraindicado para mulheres que apresentam varizes de membros inferiores.
  - (E) os métodos de barreira são eficazes, tanto como método contraceptivo quanto como medida de proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis.
- 37.** A prevenção da oftalmia gonocócica pelo método de Credé é um cuidado de rotina após a estabilização clínica do RN na sala de parto. Para tal, ao auxiliar a equipe, o técnico de enfermagem deve ter à mão
- (A) solução de nitrato de prata a 1%, para a instilação ocular.
  - (B) gaze embebida em soro fisiológico 0,9%, para limpeza do vernix caseoso presente na região ocular.
  - (C) uma ampola de vitamina K, para instilação ocular.
  - (D) solução argirol 10%, para a instilação ocular.
  - (E) solução de ringer lactato, para higienização dos olhos e retirada do vernix caseoso, antes da instilação.

38. No alojamento conjunto, ao orientar a mãe e familiares sobre a técnica de amamentação, o técnico de enfermagem deve esclarecer que o posicionamento e a pega estão adequados quando se observa que, entre outros itens,

- (A) o queixo do bebê está afastado da mama.
- (B) a aréola está mais visível acima da boca do bebê do que embaixo.
- (C) o corpo do bebê está lateralizado em relação ao da mãe e o pescoço da criança está levemente torcido.
- (D) as bochechas do bebê ficam encovadas a cada sucção.
- (E) o lábio inferior do bebê está virado para dentro.

39. Ao realizar visita domiciliar para acompanhamento de um idoso, o técnico de enfermagem (TE) foi informado que C.T., com 15 meses de idade, residente no mesmo domicílio, havia apresentado dois episódios de diarreia nas últimas seis horas. Ao observar a criança, o TE constatou que ela estava bem alerta, apresentava olhos normais, boca e língua úmidas e, quando chorava, as lágrimas estavam presentes. Seu pulso estava cheio, o enchimento capilar estava normal e o sinal da prega desaparecia rapidamente. Frente a essa situação, o TE deve orientar a família, entre outros cuidados, a

- (A) suspender a alimentação da criança por seis horas, voltando a alimentá-la, em pequenas quantidades, após esse período.
- (B) aumentar a oferta de líquidos, estimulando a ingestão de refrigerantes, chás e sucos adoçados, o que fornece uma quantidade maior de calorias.
- (C) administrar medicamento antidiarreico, três vezes ao dia, até que cessem os episódios de diarreia.
- (D) oferecer líquidos caseiros como água de arroz, soro caseiro, chás, sucos e sopas ou solução de reidratação oral (SRO) após cada evacuação diarreica.
- (E) levar a criança, imediatamente, para uma unidade de pronto atendimento para avaliação e início da reposição de líquidos por via parenteral.

Para responder às questões de números 40 e 41, leia atentamente o relato a seguir.

Em 25.03.2018, relatando ter caído da moto há cerca de 30 minutos, M.T., 28 anos, masculino compareceu à unidade de pronto atendimento, apresentando ferimento corto-contuso, superficial, na panturrilha direita. Após avaliação médica, foi encaminhado à enfermagem para a realização de curativo no ferimento e a profilaxia do tétano. Na ocasião, M.T. apresentou a carteira de vacinação contendo os seguintes registros:

Dupla adulto dT 17.01.2008	Hepatite B 08.03.2010	Febre amarela 17.01.2008
Dupla adulto dT 25.10.2008	Hepatite B 22.12.2015	
Dupla adulto dT 08.03.2010		
Dupla adulto dT 22.12.2015		

40. Em relação à imunização, de acordo com o calendário de vacinação para o estado de São Paulo/2017, é correto afirmar que

- (A) o esquema vacinal de M. T. está em dia, não sendo necessária a aplicação de vacinas nessa data.
- (B) no que diz respeito à profilaxia do tétano, o esquema vacinal de M. T. está atualizado, mas o técnico de enfermagem deve aplicar a segunda dose da vacina contra febre amarela e a primeira dose da vacina HPV.
- (C) o técnico de enfermagem deve aplicar uma dose de reforço da vacina dT, a terceira dose da vacina hepatite B, uma dose de reforço da vacina contra febre amarela e a primeira dose das vacinas SCR (sarampo, caxumba e rubéola) e HPV.
- (D) o técnico de enfermagem deve aplicar uma dose de reforço da vacina dT, a terceira dose da vacina hepatite B e uma dose da vacina SCR (sarampo, caxumba e rubéola).
- (E) no que diz respeito à profilaxia do tétano, o esquema vacinal de M.T. está atualizado, mas o técnico de enfermagem deve aplicar a terceira dose da vacina hepatite B e uma dose da vacina SCR (sarampo, caxumba e rubéola).

41. No que diz respeito à realização do curativo no ferimento,
- (A) está indicado o uso de cobertura com carvão ativado, porque previne a infecção e agiliza a cicatrização.
  - (B) deve ser realizada a aplicação de gelo ou a irrigação com água gelada na lesão, para diminuir a dor no local onde será aplicado o curativo.
  - (C) a limpeza da ferida deve ser feita por meio de irrigação com soro fisiológico 0,9%, em leve pressão, utilizando-se agulha de calibre 12 e seringa de 20 mL.
  - (D) o leito da ferida deve ser mantido seco com o propósito de se facilitar a cicatrização e evitar a necessidade futura de desbridamento mecânico.
  - (E) devido ao seu potencial de contaminação, a limpeza da ferida deve ser realizada, em jato, com solução antisséptica à base de PVPI.
42. O Ministério da Saúde estabelece, entre outros itens, como doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória imediata os casos de
- (A) dengue.
  - (B) acidente por animal potencialmente transmissor da raiva.
  - (C) acidente de trabalho com exposição a material biológico.
  - (D) hanseníase.
  - (E) infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).
43. Ao constatar que um paciente adulto está em parada cardiorrespiratória, o técnico de enfermagem deve solicitar ajuda e o desfibrilador, e, enquanto aguarda, iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar. No que diz respeito à massagem cardíaca, a frequência (F) e a profundidade (P) das compressões devem ser, respectivamente,
- (A) F = 80 a 100 compressões por minuto; P = de 6 a 7 cm.
  - (B) F = 100 a 120 compressões por minuto; P = de 8 a 10 cm.
  - (C) F = 80 a 120 compressões por minuto; P = no mínimo 5 cm e no máximo 6 cm.
  - (D) F = 60 a 80 compressões por minuto; P = no mínimo 5 cm e no máximo 8 cm.
  - (E) F = 100 a 120 compressões por minuto; P = no mínimo 5 cm e no máximo 6 cm.
44. Os cuidados imediatos para uma vítima de picada de cobra na panturrilha devem incluir, entre outras ações,
- (A) manter a vítima em repouso absoluto.
  - (B) aplicar um torniquete, cerca de dez centímetros acima do local da picada.
  - (C) aplicar um torniquete, cerca de cinco centímetros abaixo do local da picada.
  - (D) realizar a expressão do ferimento para a eliminação de parte do veneno inoculado, antes que entre na circulação.
  - (E) aplicar gelo ou fazer compressas frias no local da picada.
45. Enquanto o técnico de enfermagem (TE) realizava visita domiciliar a uma puérpera e ao seu recém-nascido, a avó da criança sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus no antebraço e peito do pé direito, ao virar sobre si uma caneca de água fervente. Frente a essa situação o TE deve, entre outras medidas,
- (A) perfurar as bolhas que se formarem, cobrir a área afetada com gaze ou pano seco e limpo e encaminhar a vítima ao pronto-socorro.
  - (B) aplicar gelo sobre a área afetada, com o propósito de resfriamento.
  - (C) cobrir a área afetada com óleo de cozinha ou creme hidratante, para diminuir a dor e hidratar a pele, evitando a formação de bolhas.
  - (D) irrigar a área queimada com soro fisiológico ou água, em abundância, objetivando seu resfriamento.
  - (E) irrigar a área queimada com álcool, para diminuir a dor, e aplicar pomada à base de antibiótico para prevenir a infecção.
46. Ao receber o plantão, o técnico de enfermagem foi informado de que um paciente que ficaria sob seus cuidados estava recebendo nutrição enteral, por tubo nasoentérico, por bomba de infusão. No que diz respeito ao posicionamento no leito, esse paciente deve ser mantido
- (A) em decúbito dorsal horizontal.
  - (B) com o tórax em nível inferior ao abdome, entre as infusões da dieta.
  - (C) com a cabeceira do leito elevada em 30 a 45°.
  - (D) em decúbito lateral direito, por 30 minutos, após infusão da dieta.
  - (E) com os pés da cama elevados em cerca de 10 a 15 cm.

47. Ao admitir D.C., 84 anos, sexo feminino, internada com diagnóstico de pneumonia, o técnico de enfermagem observou que, entre outros itens, constava da prescrição médica a instalação de oximetria de pulso. Em relação a esse procedimento, é correto afirmar que

- (A) se trata de um método não invasivo para monitorar continuamente as concentrações de dióxido de carbono no sangue do paciente.
- (B) a presença de esmalte de unha, o tom escuro da pele e a presença de tremores não interferem na precisão da leitura.
- (C) em idosos, os resultados obtidos não são confiáveis, e o paciente deve ser observado cuidadosamente.
- (D) ao realizar a leitura, valores observados na faixa de 75 a 90 % de saturação são considerados como normais.
- (E) para sua instalação, a sonda/sensor do equipamento podem ser conectados à ponta do dedo, à testa, à orelha ou à ponte do nariz.

48. Considerando que as quedas representam um sério problema para as pessoas com idade avançada e estão associadas a elevados índices de morbi-mortalidade, ao realizar visita domiciliar em residências habitadas por idosos, o técnico de enfermagem deve orientar a adoção de medidas preventivas, tais como:

- (A) dar preferência ao banho em banheira em vez do banho sentado.
- (B) colocar pisos antiderrapantes e barras de apoio nos banheiros.
- (C) utilizar tapetes no início e no fim da escada, facilitando a percepção dos primeiros degraus.
- (D) acomodar os gêneros alimentícios e outros objetos de uso cotidiano em prateleiras altas.
- (E) dar preferência a tapetes pequenos em salas e quartos em vez dos grandes.

49. Considere os aspectos relacionados à epidemiologia e à história natural e prevenção de doenças, e relacione as colunas do quadro a seguir de forma a tornar verdadeira a associação entre os níveis de aplicação das medidas preventivas e as ações de prevenção.

Níveis de aplicação das medidas preventivas		Ações	
a	Prevenção primária	I	Fisioterapia, reabilitação, terapia ocupacional.
b	Prevenção secundária	II	Tratamento para evitar a propagação de doenças; inquéritos para a descoberta de casos na comunidade; exames periódicos e individuais, para a detecção precoce de casos.
c	Prevenção terciária	III	Moradia adequada, imunização, controle de vetores.

Assinale a alternativa correta.

- (A) a-I; b-II; c-III.
- (B) a-III; b-I.; c-II.
- (C) a-II; b-III; c-I.
- (D) a-III; b-II; c-I.
- (E) a-I; b-III; c-II.

50. Leia atentamente a notícia a seguir.

*Para resolver problemas de saúde,  
moradores criam conselho local*

Para resolver problemas de saúde, moradores do setor Morada do Sol, em Palmas, criaram um conselho local, composto por 12 membros. O objetivo é levar as demandas da população para as autoridades quando o poder público não estiver atendendo.

O conselho nasceu dentro de uma unidade de saúde há dois meses.

Só no centro de saúde do setor Morada do Sol, são feitos cerca de 11 mil atendimentos por mês. Um dos principais problemas enfrentados pela população é a falta de equipes para atender todos sem muita espera.

“A dificuldade maior que a gente encontra hoje é o grande número de pessoas. A gente tem duas equipes para atender quase 11 mil pessoas”, diz a coordenadora do conselho, Eneci Batista.

O conselho local de saúde vai se reunir uma vez por mês. Além do setor Morada do Sol, contará com representantes de vários outros bairros da região.

Para o secretário municipal de saúde, Nesio Fernandes, o envolvimento da comunidade é fundamental para melhoramento da saúde. Os conselhos locais de saúde são espaços de pactuação entre a gestão e a comunidade.

(<http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2017/02>.  
Acesso em 06.01.2018. Adaptado)

A criação e a atuação do conselho de saúde exemplificam a aplicação do princípio organizativo do SUS de

- (A) Universalidade.
- (B) Participação da comunidade.
- (C) Equidade.
- (D) Integralidade.
- (E) Humanização.

