

**DOMINGO DE MANHÃ**

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC  
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2023**

**MÉDICO (ANESTESIOLOGIA)**

**INSTRUÇÕES**

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
  - contém 40 (quarenta) questões;
  - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1\_08/05/2023 18:30:09



**POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**

**QUESTÃO 01** – De acordo com o disposto na Portaria nº 2.436/2017, a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos \_\_\_\_\_, de forma a \_\_\_\_\_ ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) equivalentes – associar a
- B) distintos – distinguir de
- C) discordantes – discernir entre
- D) contraditórios – distinguir e discernir entre
- E) incompatíveis – associar e ligar a

**QUESTÃO 02** – Em relação à Atenção Básica, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas.
- ( ) Ações de saúde que envolvem cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- ( ) As equipes assumem responsabilidade sanitária sobre território definido.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – F.

**QUESTÃO 03** – De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

- I. Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.
- II. Garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica.
- III. Inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.
- IV. Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica.

Qual estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 04** – Assinale a alternativa INCORRETA considerando o Estatuto da Pessoa Idosa (2003) e suas alterações.

- A) É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.
- B) Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social.
- C) Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas, gratuitamente, próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- D) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- E) É assegurado o direito a acompanhante à pessoa idosa internada ou em observação, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

**QUESTÃO 05** – Segundo o Estatuto do Idoso, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticados contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a qualquer dos seguintes órgãos:

- I. Conselho Municipal da Pessoa Idosa.
- II. Conselho Interfederativo da Pessoa Idosa.
- III. Conselho Estadual da Pessoa Idosa.
- IV. Defensoria Pública da Pessoa Idosa.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 06** – A respeito de indicadores de saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. Um indicador é uma variável, característica ou atributo de Estrutura, Processo ou Resultado, baseada em Donabedian (1980, 1990), que é capaz de sintetizar e/ou representar e/ou dar maior significado ao que se quer avaliar.
- II. O componente Estrutura inclui a relação entre categorias de recursos humanos existentes, tal como o número de agentes comunitários de saúde ou de profissionais de enfermagem.
- III. O componente Processo inclui a relação entre as atividades de distintos profissionais, tal como número de atividades sobre saúde reprodutiva realizadas para adolescentes no serviço de saúde ou número de primeira consulta ginecológica para gestantes.
- IV. Entre os componentes adotados na construção de um indicador, pode-se avaliar as relações que permitem a análise de quanto cada componente influencia o outro, tal como a relação estrutura/processo, avaliando a relação entre recursos existentes e a produtividade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 07** – A respeito da utilização da epidemiologia em saúde, considerando os termos comuns usados na interpretação da literatura médica para exames diagnósticos, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A probabilidade pós-teste é igual a chances pós-teste / (1 + chances pós-teste).
- ( ) Através de um nomograma, pode-se calcular a probabilidade pós-teste usando a probabilidade pré-teste e a razão de verossimilhança, sem ter que converter a probabilidade pré-teste em chances.
- ( ) A razão de verossimilhança negativa é a razão entre a probabilidade de um resultado negativo de exame entre pacientes sem a doença e a probabilidade de um resultado positivo entre pacientes com a doença.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

**QUESTÃO 08** – No campo da ética médica ou bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No estabelecimento de prioridades nas políticas públicas de saúde, os gestores têm utilizado balizamentos, entre eles, as bases epidemiológicas e demográficas, a vulnerabilidade do agravo, os recursos, a tecnologia disponível e a efetividade dos procedimentos.
- B) Como Norma Diceológica, é direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- C) Como Norma Diceológica, é direito do médico realizar a procriação medicamente assistida, desde que seja com o objetivo de criar embriões com a finalidade de escolha de sexo.
- D) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- E) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente.

**QUESTÃO 09** – Assinale a alternativa verdadeira sobre a organização da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA).

- A) A Diretoria terá mandato bianual, que coincidirá com o ano-calendário civil.
- B) O Conselho Superior tem atribuições de conferir, verificar, comprovar e opinar, trimestralmente, sobre a administração financeira da SBA.
- C) Ao Conselho Fiscal da SBA, compete autorizar e ordenar o pagamento de despesas orçamentárias.
- D) A SBA possui três departamentos: Administrativo, Científico e de Defesa Profissional.
- E) As reeleições são permitidas para todos os cargos de Diretoria e Conselho Fiscal.

**QUESTÃO 10** – O conselho superior da SBA:

- I. É constituído por Representantes das Regionais, pelo Presidente do Conselho Superior e pela Diretoria da SBA.
- II. Realiza a eleição para os cargos não administrativos da SBA.
- III. É regido por regimento próprio.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 11** – Assinale a alternativa correta a respeito do risco ocupacional de infecção por hepatite.

- A) O vírus da hepatite B sofre inativação em segundos após contato com superfícies externas.
- B) Em pessoas não vacinadas, o risco de soroconversão após a exposição percutânea ao HBV fica em torno de 1%.
- C) Os sinais de infecção aguda por vírus B incluem febre, icterícia, fadiga e dor abdominal.
- D) Profissionais da saúde devem receber o esquema vacinal contra a Hepatite B com 2 doses.
- E) Aproximadamente 30% dos que recebem o esquema completo vacinal contra a Hepatite B não desenvolverão imunidade completa.

**QUESTÃO 12** – Analise as assertivas abaixo sobre a avaliação não invasiva da função ventricular pré-operatória:

- I. Está indicada em pacientes com dispneia de origem desconhecida.
- II. Deve ser solicitada em pacientes portadores de insuficiência cardíaca que apresentam piora da dispneia ou mudança do quadro clínico.
- III. É mandatória em procedimentos de médio a grande porte em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva que não tenham tido a função ventricular avaliada no último ano.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 13** – Paciente de 52 anos será submetido à herniorrafia inguinal aberta. Durante a avaliação pré-anestésica, verifica-se diabetes melito insulino-dependente e perda de função renal com creatinina sérica de 2,5mg/dL. De acordo com o Índice Cardíaco Revisado, o risco desse paciente desenvolver evento cardíaco maior é de:

- A) 0,4%.
- B) 1,0%.
- C) 2,4%.
- D) 5,4%.
- E) 9%.

**QUESTÃO 14** – Assinale a alternativa correta a respeito dos Anestésicos Locais (ALs).

- A) Bloqueiam a condução nervosa através da inibição dos canais iônicos de cálcio voltagem-dependentes.
- B) A forma ionizada é capaz de penetrar as membranas e atingir o sítio de ação.
- C) Quanto menor o pKa do AL, maior será a porcentagem da sua forma não ionizada em determinado pH.
- D) A sequência de início e recuperação do bloqueio de condução das fibras simpáticas, sensoriais e motoras de um nervo periférico depende fortemente da sua sensibilidade intrínseca ao AL.
- E) É necessário que, pelo menos, 2 nódulos Ranvier consecutivos sejam expostos a concentrações adequadas de AL para que ocorra o bloqueio de condução em fibras mielinizadas.

**QUESTÃO 15** – Sobre a administração de flumazenil intravenoso, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- Na suspeita de overdose por benzodiazepínicos, deve ser administrado em incrementos 0,2-0,5 mg até 3 mg.
- Tende a reverter os efeitos hipnóticos e respiratórios de forma mais efetiva do que a amnésia.
- Atua como antagonista não competitivo do receptor benzodiazepínico.
- Pode precipitar efeitos cardiovasculares importantes na presença de benzodiazepínico.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – F – V – V.
- E) F – V – V – V.

**QUESTÃO 16** – “O etomidato atua nos receptores \_\_\_\_\_ promovendo \_\_\_\_\_ de condutância ao íon \_\_\_\_\_”.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) GABA A – aumento – Cloro
- B) GABA B – aumento – Cloro
- C) NMDA – diminuição – Sódio
- D) NMDA – aumento – Sódio
- E) Gaba A – diminuição – Cloro

**QUESTÃO 17** – O coeficiente sangue: gás determina qual das seguintes características dos agentes halogenados?

- A) Velocidade da indução.
- B) Potência.
- C) Toxicidade.
- D) Metabolização.
- E) Absorção pelo circuito.

**QUESTÃO 18** – Qual das catecolaminas abaixo apresenta maior afinidade pelo receptor beta-2 adrenérgico?

- A) Norepinefrina.
- B) Dopamina.
- C) Dobutamina.
- D) Isoproterenol.
- E) Fenilefrina.

**QUESTÃO 19** – Analise as assertivas abaixo sobre a monitorização da Junção Neuromuscular:

- I. O número de contrações pós-tetânicas é proporcional a profundidade do bloqueio.
- II. A estimulação *double burst* foi desenvolvida para aumentar a sensibilidade de identificação objetiva da paralisia residual.
- III. Quando comparada com a mecanomiografia, a aceleromiografia superestima os valores da sequência de quatro estímulos (TOF).

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 20** – Um cilindro de oxigênio com capacidade de 43,5 litros registra a pressão de 150 atm. Qual o volume de gás que esse cilindro comporta quando completamente preenchido?

- A) 6.525 L.
- B) 6.481,5 L.
- C) 5.225 L.
- D) 3.540 L.
- E) 2.890 L.

**QUESTÃO 21** – É correto afirmar sobre a anatomia espinhal que:

- A) Duas arteriais espinhais anteriores suprem o terço anterior da medula espinhal enquanto que os dois terços posteriores da medula espinhal são supridos por uma única artéria espinhal posterior.
- B) A pia-máter é uma membrana pobremente vascularizada que reveste intimamente a medula espinhal e o cérebro.
- C) O fluido cefalorraquidiano fica localizado no espaço entre a pia-máter e a aracnoide.
- D) A medula espinhal distal termina em L1 nos lactentes e em L3 nos adultos.
- E) A fibras pré-ganglionares simpáticas se originam entre L1 e L4.

**QUESTÃO 22** – Analise as assertivas abaixo sobre a realização de bloqueio periférico dos membros superiores:

- I. O bloqueio axilar não garante a cobertura do território inervado pelo nervo cutâneo lateral do antebraço.
- II. O bloqueio interescalênico costuma atingir preferencialmente as raízes de C5-C7.
- III. O bloqueio interescalênico guiado por ultrassom foi capaz de reduzir drasticamente a incidência de bloqueio do nervo frênico quando comparado à técnica de neuroestimulação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 23** – Assinale a alternativa que contém contraindicação absoluta ao bloqueio neuroaxial.

- A) Aumento da pressão intracraniana.
- B) Mielopatia.
- C) Estenose do Canal espinhal.
- D) Cirurgia espinhal prévia.
- E) Esclerose múltipla.

**QUESTÃO 24** – A respeito do cuidado de pacientes na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), assinale a alternativa correta.

- A) O bloqueio neuromuscular residual é facilmente identificado e está associado a aumento do risco de pneumonia pós-operatória.
- B) A hiperglicemia deve ser tratada agressivamente tendo como alvo 80-120 mg/dL.
- C) A principal causa de distúrbio ventilação/perfusão pulmonar na SRPA é a hipoventilação.
- D) O uso precoce de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CIPAP) em pacientes com síndrome da apneia do sono está associado a aumento de deiscência em cirurgias abdominais.
- E) Os agentes antidopaminérgicos devem ser evitados em idosos.

**QUESTÃO 25** – Analise as assertivas abaixo a respeito da monitorização não invasiva da pressão arterial:

- I. A pressão deve ser medida no mínimo a cada 5 minutos durante todos os procedimentos sob anestesia.
- II. Medidas falsamente altas podem ocorrer se o manguito for muito pequeno e medidas falsamente baixas, se o manguito for muito grande.
- III. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% da circunferência braquial.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 26** – Paciente de 3 meses de idade, 5 Kg de peso foi submetido à laparotomia exploradora. No pós-operatório, vem recebendo bupivacaína na concentração de 0,125% em cateter peridural. Qual o regime de infusão contínua peridural mais adequado para o paciente?

- A) 0,01 ml/h.
- B) 0,75 ml/h.
- C) 3 ml/h.
- D) 5 ml/h.
- E) 6 ml/h.

**QUESTÃO 27** – Qual dos nervos abaixo pode ser estimulado de forma não intencional durante a ressecção transuretral de tumor de bexiga inferolateral?

- A) Obturador.
- B) Perineal.
- C) Pudendo.
- D) Hipogástrico.
- E) Esplâncnico.

**QUESTÃO 28** – Assinale a alternativa correta a respeito do tratamento da síndrome de ressecção transuretral de próstata.

- A) Nos casos com natremia sérica maior que 120 mEq/L, o tratamento indicado é a restrição de fluidos e administração de diuréticos.
- B) Casos leves devem ser tratados com cloreto de sódio 3% intravascular.
- C) A taxa máxima de infusão do cloreto de sódio a 3% é de 150 mL/h.
- D) A elevação do nível sérico de sódio não deve exceder 12 mEq/L em um período de 24h.
- E) A infusão de cloreto de sódio 3% deve ser descontinuada somente quando o sódio sérico atingir 135 mEq/L.

**QUESTÃO 29** – Assinale a alternativa que apresenta indicação absoluta para o isolamento pulmonar.

- A) Cirurgia esofágica.
- B) Lobectomia média.
- C) Ressecção de massa mediastinal.
- D) Simpatectomia bilateral.
- E) Fístula broncopleural.

**QUESTÃO 30** – Assinale a alternativa correta a respeito da monitorização eletrofisiológica intraoperatória.

- A) Os anestésicos venosos apresentam interferência inibitória significativa nos potenciais evocados somatosensitivos e nos potenciais evocados motores.
- B) O efeito dos anestésicos voláteis na eletroneuromiografia é mínimo.
- C) Os bloqueadores neuromusculares tornam imprecisa a monitorização dos potenciais evocados somatosensitivos.
- D) Os potenciais evocados motores são úteis para a medida da integridade das colunas dorsais da coluna espinhal.
- E) Os potenciais evocados sensitivos são úteis para verificar o trato corticoespinhal.

**QUESTÃO 31** – Paciente com obesidade grau 3 será submetido à cirurgia bariátrica. Qual dos medicamentos abaixo deve ter sua dose calculada de acordo com o peso corporal total do paciente?

- A) Atracúrio.
- B) Dexmedetomidina.
- C) Fentanil.
- D) Rocurônio.
- E) Heparina.

**QUESTÃO 32** – Paciente de 74 anos está sendo submetido à artroplastia de quadril direito. Durante a implantação do cimento ósseo, apresenta queda da saturação e da pressão arterial. Qual a conduta mais apropriada para o caso?

- A) Administrar oxigênio a 100% e fornecer suporte hemodinâmico.
- B) Realizar anticoagulação imediata.
- C) Administração de adrenalina.
- D) Compressão jugular bilateral.
- E) Elevação dos membros inferiores.

**QUESTÃO 33** – Assinale a alternativa correta a respeito da transfusão de plaquetas no perioperatório.

- A) Apresenta o menor risco de contaminação bacteriana dentre os hemocomponentes.
- B) Um pool de plaquetas eleva de 5.000-10.000 a contagem plaquetária.
- C) É armazenada em sob refrigeração entre 1-6 graus Celsius.
- D) O concentrado de plaquetas tem uma validade em torno de 5-7 dias.
- E) A compatibilidade ABO é necessária.

**QUESTÃO 34** – Qual das situações abaixo apresenta acidose metabólica com ânion gap normal?

- A) Cetoacetose diabética.
- B) Síndrome urêmica.
- C) Sepsis.
- D) Ileostomia.
- E) Intoxicação por salicilato.

**QUESTÃO 35** – Assinale a alternativa que apresenta informação correta a respeito da pré-oxigenação antes da anestesia.

- A) Uma pré-oxigenação satisfatória é obtida orientando o paciente a respirar normalmente sob máscara facial durante 1 minuto.
- B) A cabeceira elevada melhora a qualidade da pré-oxigenação apenas em pacientes obesos.
- C) O uso de pressão positiva não invasiva durante a pré-oxigenação aumenta a distensão gástrica e o risco de aspiração.
- D) O alvo da pré-oxigenação é uma concentração de oxigênio expirada maior que 80%.
- E) É necessário ofertar oxigênio a 100% em um fluxo de 10-12L/min para que a pré-oxigenação seja efetiva.

**QUESTÃO 36** – Assinale a alternativa que indica a alteração fisiológica esperada durante a gestação a termo.

- A) Aumento do volume plasmático em 10%.
- B) Redução da resistência vascular sistêmica em 70%.
- C) Manutenção dos níveis da resistência vascular pulmonar.
- D) Aumento da fração de ejeção.
- E) Elevação da pressão venosa central.

**QUESTÃO 37** – Analise as assertivas abaixo sobre o embolismo aéreo em ressecção de tumores intracranianos em posição sentada:

- I. A combinação de doppler precordial e monitorização de CO<sub>2</sub> expirado é capaz de identificar a sua ocorrência com segurança.
- II. A compressão jugular faz parte do manejo.
- III. O ecocardiograma transesofágico é mais sensível para o diagnóstico e pode ser usado com segurança em procedimentos prolongados que envolvam a flexão cervical.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 38** – Analise as assertivas a seguir sobre o manejo anestésico de pacientes com traumatismo espinhal:

- I. A pressão arterial média deve ser mantida entre 85-90 mmHg para otimizar a perfusão medular e prevenir a injúria secundária.
- II. Esteroides estão indicados, pois melhoram o desfecho neurológico.
- III. Lesões acima de L3-L4 cursam com o chamado choque neurogênico.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 39** – Faz parte das medidas para prevenção ou manejo de incêndio em procedimentos otorrinológicos de via aérea:

- A) A concentração de oxigênio deve ser mantida entre 60-80% para reduzir o risco de incêndio.
- B) Optar por óxido nitroso ao invés de ar comprimido na ventilação.
- C) Insuflar o balonete do tubo orotraqueal com salina.
- D) Alterar imediatamente a concentração de oxigênio fornecida para 30% no caso de incêndio.
- E) Não fazer uso de salina para instilação na região acometida.

**QUESTÃO 40** – Sobre a análise por intenção de tratar em estudos randomizados de superioridade, é correto afirmar que:

- A) Tende a superestimar o efeito do tratamento quando a adesão ao tratamento não é completa.
- B) Considera o tratamento de fato recebido por cada participante e não o tratamento para o qual este foi originalmente alocado.
- C) Inclui apenas os indivíduos que receberam de forma completa o tratamento para o qual foram alocados originalmente.
- D) Consiste em uma estratégia de randomização.
- E) Os desfechos são analisados de acordo com o tratamento para o qual o paciente foi originalmente alocado, mesmo que tenham ocorrido desvios no tratamento.