

1

**BANCO DO BRASIL****AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO****LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o tema da Redação e 70 (setenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

| Conhecimentos Básicos     |                |                        |                | Conhecimentos Específicos |                |
|---------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Língua Portuguesa         |                | Cultura Organizacional |                |                           |                |
| Questões                  | Pontuação      | Questões               | Pontuação      | Questões                  | Pontuação      |
| 1 a 20                    | 1,0 ponto cada | 21 a 30                | 1,0 ponto cada | 31 a 70                   | 1,0 ponto cada |
| Total: 20,0 pontos        |                | Total: 10,0 pontos     |                | Total: 40,0 pontos        |                |
| <b>Total: 70,0 pontos</b> |                |                        |                |                           |                |

b) um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado à marcação das respostas das questões objetivas formuladas nas provas cujo verso é a página para desenvolvimento da Redação, que vale até 100,0 pontos, o qual é denominado **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**.02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.04 - No **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, de forma contínua e densa. A leitura ótica do **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO** é sensível a marcas escuras, portanto, os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.

Exemplo:      (A)      ●      (C)      (D)      (E)

05 - O candidato deve ter muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**, para não o **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO** SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens superior e/ou inferior - **DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar **UMA RESPOSTA**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - **SERÁ ELIMINADO** desta Seleção Externa o candidato que:a) se utilizar, durante a realização das provas, de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios não analógicos, *notebook*, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, telefones celulares, *paggers*, microcomputadores portáteis e/ou similares;b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**;c) se recusar a entregar o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**, quando terminar o tempo estabelecido;d) não assinar a **LISTA DE PRESENÇA** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**.**Obs:** Iniciadas as provas, o candidato só poderá retirar-se da sala após decorrida **1 (uma) hora** do efetivo início das mesmas e não poderá levar o **CADERNO DE QUESTÕES**, a qualquer momento.09 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.10 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal este **CADERNO DE QUESTÕES**, o **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO** e **ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA**.11 - O **TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS E DE REDAÇÃO É DE 5 (CINCO) HORAS**, incluído o tempo para a marcação do seu **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**.12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço eletrônico da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (<http://www.cesgranrio.org.br>).

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****31**

Nos termos da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), NR-05, o treinamento para a CIPA deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens:

- (A) noções sobre doenças cardiovasculares e medidas de prevenção
- (B) noções sobre doenças transmissíveis pelo contato sexual e medidas de prevenção
- (C) noções sobre doenças transmissíveis pela utilização da água não potável e medidas de prevenção
- (D) noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e medidas de prevenção
- (E) noções sobre a hepatite nas suas várias modalidades e medidas de prevenção

**32**

Nos termos da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), NR-07, em relação à realização de exames médicos periódicos em funcionário submetido ao agente químico arsênico, a periodicidade de avaliação deverá ser, no mínimo,

- (A) mensal
- (B) bimestral
- (C) trimestral
- (D) semestral
- (E) anual

**33**

Nos termos da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), NR-09, consideram-se agentes biológicos:

- (A) vibrações
- (B) ruídos
- (C) bacilos
- (D) radiações ionizantes
- (E) temperaturas extremas

**34**

Nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, constitui medida preventiva vinculada à medicina do trabalho, o dever do empregador de manter no estabelecimento

- (A) equipe de emergência médica completa
- (B) aparelhos médicos para tratar de mal súbito
- (C) tecnologia avançada em equipamentos de saúde
- (D) local adequado para exercícios físicos
- (E) material de primeiros socorros médicos

**35**

Nos termos da legislação federal, que trata de medicina e segurança do trabalho, se as condições de ambiente se tornarem desconfortáveis, em virtude de instalações geradoras de frio ou de calor, quanto às condições de conforto térmico,

- (A) o uso de máquinas de ar condicionado é sempre obrigatório.
- (B) o maquinário, havendo desconforto, deverá ser desligado.
- (C) o trabalho deverá ocorrer com vestimenta própria.
- (D) a presença de água potável é compulsória para fornecimento.
- (E) os locais de trabalho devem ter ventilação artificial.

**36**

A Figura a seguir exibe uma imagem muito conhecida dos usuários do sistema operacional Windows: uma tela contendo ícones associados a programas ou documentos de uso frequente.



Para que um ícone relativo a um documento MS Word, ou MS Excel (e não um ícone contendo um atalho para o documento), seja exibido em uma tela como a mostrada na Figura acima, o documento em questão deve residir em qual pasta de uma instalação padrão do Windows 7 em português?

- (A) Documentos
- (B) Área de Trabalho
- (C) Windows
- (D) Arquivos de Programas
- (E) Imagens

**37**

Qual programa é comumente usado para se navegar por aplicações Web?

- (A) Twitter
- (B) Facebook
- (C) Microsoft Word
- (D) Google Chrome
- (E) Windows Explorer


**38**

Qual arquivo que, por questões de segurança, não pode ser enviado para terceiros através do Gmail diretamente anexado ao email?

- (A) prog.exe
- (B) relatorio.xlsx
- (C) carta.docx
- (D) foto.jpg
- (E) inicio.html

**39**

A Figura a seguir exibe um parágrafo de um texto produzido com o MS Word 2010. Note que à esquerda do parágrafo é exibida uma seta de seleção.



O que será selecionado se, nas condições acima, for feito um único clique com o mouse?

- (A) Brasil
- (B) Brasil,
- (C) Brasil, oficialmente República Federativa do Brasil, é o maior país da América do
- (D) Brasil, oficialmente República Federativa do Brasil, é o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área territorial e população.
- (E) Nada será selecionado.

40

No curso de uma gestação normal, uma trabalhadora de vida sedentária, que se encontra no terceiro trimestre da gravidez, deve ser orientada quanto ao risco de apresentar

- (A) marcha anserina
- (B) cloasma gravídico
- (C) aversão a odores
- (D) náuseas e vômitos
- (E) pigmentação da linha alba

**Considere a situação descrita a seguir para responder às questões de n<sup>os</sup> 41 e 42.**

No ambulatório de pronto atendimento de uma instituição, deu entrada um trabalhador com queixa de cefaleia intensa e apresentando vômitos em jato.

41

O auxiliar de enfermagem verificou os sinais vitais do trabalhador e observou que a tensão sistólica estava bem elevada, enquanto a diastólica apresentava-se bem diminuída, caracterizando um quadro de

- (A) hipertensão
- (B) hipotensão
- (C) normotensão
- (D) tensão convergente
- (E) tensão divergente

42

Para diminuir o fluxo sanguíneo cerebral e a pressão intracraniana, a equipe médica solicitou ao auxiliar de enfermagem que colocasse o trabalhador de repouso na posição de

- (A) Fowler
- (B) Sims
- (C) Heimlich
- (D) Kristeller
- (E) Trendelenburg

43

Em âmbito municipal, a garantia da assistência ao pré-natal e puerpério, planejamento familiar e prevenção do câncer de colo uterino estão estabelecidas como ações básicas

- (A) norteadoras
- (B) máximas
- (C) mínimas
- (D) ampliadas
- (E) compartilhadas

44

Numa avaliação multidimensional da pessoa idosa, quando o profissional de saúde solicita que ela fale o nome de alguns objetos e, três minutos depois, repita esses mesmos nomes, está sendo avaliada a dimensão do(a)

- (A) humor
- (B) estado mental
- (C) suporte social
- (D) incontinência urinária
- (E) atividade diária

45

A qual sistema ou aparelho a queixa de cialgia de um trabalhador está relacionada?

- (A) Nervoso
- (B) Digestivo
- (C) Tegumentar
- (D) Respiratório
- (E) Músculo-esquelético

46

Qual é a doença cujas manifestações clínicas da fase crônica aparecem na vida adulta, anos após a fase aguda, apresentando alterações cardíacas e/ou digestivas?

- (A) Febre tifoide
- (B) Leishmaniose visceral
- (C) Doença de Chagas
- (D) Infecção por poliovírus
- (E) Esquistossomose mansônica

**Considere a situação descrita a seguir para responder às questões de n<sup>os</sup> 47 a 50.**

T. M., sexo masculino, auxiliar de enfermagem com especialização pós-média em enfermagem do trabalho, foi admitido por concurso em uma instituição prestadora de serviços bancários. Depois de concluído o período de treinamento em serviço no ambulatório da instituição, ele foi escalado para o setor de provas funcionais.

47

Ao orientar o preparo para avaliação de audiometria em trabalhadores expostos ao ruído, T. M. destacou a necessidade de que o trabalhador fizesse repouso auditivo, em horas, de, no mínimo,

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 12
- (E) 14

48

A equipe de saúde informou ao auxiliar de enfermagem que há a necessidade de utilizar os cartões de Jaeger para realizar o teste de

- (A) foria vertical
- (B) foria lateral
- (C) distinção de cores
- (D) percepção de profundidade
- (E) acuidade visual próxima

49

Diante do resultado da Tonometria, que indicou a elevação da pressão intraocular, houve a necessidade de o trabalhador ser encaminhado ao oftalmologista para diagnóstico precoce de

- (A) miopia
- (B) presbiopia
- (C) hipermetropia
- (D) astigmatismo
- (E) glaucoma

**50**

Na avaliação inicial de controle dos sinais vitais, T.M. aferiu frequência de 20 irpm, o que indicou que o trabalhador apresentava

- (A) apneia
- (B) eupneia
- (C) dispneia
- (D) bradipneia
- (E) taquipneia

**51**

Para realizar a higiene oral de pessoa portadora de herpes simples, o profissional de enfermagem deve utilizar

- (A) gorro
- (B) luvas
- (C) óculos
- (D) capote
- (E) máscara

**52**

Em relação aos riscos ocupacionais, as condições de saúde dos trabalhadores e suas queixas devem ser consideradas na fase de

- (A) antecipação
- (B) reconhecimento
- (C) classificação
- (D) avaliação
- (E) controle

**53**

Com o objetivo de evitar contaminação, as orientações de enfermagem, tais como: conservar as mãos limpas, usar material esterilizado quando adequado e cuidar do material contaminado são condições gerais do processo de trabalho referente à(ao)

- (A) esforço
- (B) conforto
- (C) ergonomia
- (D) segurança
- (E) economia de tempo

**54**

Os mecanismos de defesa são uma das principais estratégias que o ser humano utiliza para lidar com o sofrimento psíquico.

Quando um profissional de enfermagem desloca para os outros seus sentimentos incômodos acerca do setor no qual foi lotado, expressa o mecanismo de

- (A) projeção
- (B) repressão
- (C) resiliência
- (D) racionalização
- (E) formação reativa

**55**

Conforme disposto na Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, a notificação compulsória é obrigação de todos os profissionais de saúde.

Quando se tratar de doenças, agravos e eventos constantes do Anexo II dessa Portaria, deve ser notificada às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde (SES e SMS) em, no máximo, 24 horas, a partir da suspeita inicial, dentre outras, a seguinte doença:

- (A) coqueluche
- (B) hanseníase
- (C) dengue
- (D) tétano
- (E) tuberculose

**56**

A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, do adolescente, dos trabalhadores da área da saúde e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em relação à vacinação do adulto, houve ampliação da faixa etária, em anos, para

- (A) 10 a 49
- (B) 15 a 49
- (C) 20 a 39
- (D) 30 a 49
- (E) 30 a 59

**57**

Qual é a população que apresenta maior fragilidade em seu sistema imunológico referente aos linfócitos T CD4+ e, em função disso, deve ser foco das campanhas a favor do diagnóstico precoce da soropositividade para o HIV/Aids?

- (A) Lactentes
- (B) Gestantes
- (C) Idosos
- (D) Adultos
- (E) Adolescentes

**58**

As varizes de membros inferiores acometem 20% da população, e sua sintomatologia é causa de afastamento laboral.

Qual é o fator que através da progesterona provoca o relaxamento da musculatura lisa da parede de veias tornando-as varicosas?

- (A) Etário
- (B) Ponderal
- (C) Hereditário
- (D) Gestacional
- (E) Profissional

**59**

Na avaliação do estado geral de um paciente, a perda da força motora dos músculos é denominada:

- (A) astenia
- (B) apatia
- (C) atonia
- (D) miastenia
- (E) atrofia

**60**

Alguns exames e procedimentos terapêuticos requerem a colocação do paciente em uma determinada posição, expondo-o o menos possível.

A posição indicada para cirurgia ou exames de perineo é a

- (A) genupeitoral
- (B) litotômica
- (C) ortostática
- (D) supina
- (E) prona

**61**

Ao aplicar, em adultos, medicamento no canal auditivo, o auxiliar de enfermagem deve

- (A) inclinar lateralmente a cabeça do paciente e pingar a solução puxando pavilhão auditivo para cima e para baixo.
- (B) inclinar lateralmente a cabeça do paciente e pingar a solução puxando pavilhão auditivo para cima e para trás.
- (C) inclinar lateralmente a cabeça do paciente e pingar a solução puxando pavilhão auditivo para baixo e para trás.
- (D) manter a cabeça do paciente ereta e pingar a solução puxando o pavilhão auditivo para baixo .
- (E) manter a cabeça do paciente ereta e pingar a solução puxando o pavilhão auditivo para baixo e para frente.

**62**

Considerando-se os cuidados gerais no preparo e na administração de medicamentos, deve-se

- (A) observar a regra dos cinco certos, antes da administração de um medicamento.
- (B) ler o rótulo do medicamento, duas vezes antes de prepará-lo e administrá-lo.
- (C) deixar o medicamento próximo ao leito, caso o paciente esteja ausente.
- (D) checar o horário do medicamento na prescrição, caso o paciente esteja ausente.
- (E) preparar, no início do plantão, todos os medicamentos que serão administrados no plantão.

**63**

Na assistência de enfermagem pós-biópsia hepática, o paciente deverá ser mantido

- (A) em jejum por 6 horas, após o exame
- (B) em repouso absoluto por 48 horas
- (C) em repouso, no leito, por 12 horas
- (D) em decúbito lateral esquerdo por 2 horas
- (E) com controle de sinais vitais de 15 em 15 minutos nas primeiras 2 horas

**64**

Foram prescritos 2000 ml de soro glicosado a 5% para serem administrados num período de 6 horas.

A velocidade de infusão em gotas por minuto, deverá ser de, aproximadamente,

- (A) 60
- (B) 86
- (C) 92
- (D) 112
- (E) 136

**65**

O auxiliar de enfermagem deve estar preparado para dar assistência aos pacientes, praticando boa mecânica corporal, evitando fadiga e tensão desnecessárias.

De acordo com a boa mecânica corporal, ele deve

- (A) curvar-se para pegar algum objeto no chão, sem flexionar os joelhos.
- (B) manter os pés juntos para melhor estabilidade corporal.
- (C) mudar o decúbito do paciente, mesmo que ele possa fazê-lo sozinho.
- (D) evitar puxar o paciente em sua direção, uma vez que empurrá-lo exige menos esforço.
- (E) carregar objetos pesados junto ao corpo.

**66**

O objetivo da enfermagem, em relação à segurança do paciente e à sua própria, é evitar a ocorrência de acidentes e traumatismos.

Visando à prevenção de acidentes causados por agentes físicos, recomenda-se

- (A) usar grades nas camas e janelas.
- (B) manter em vigilância as autoclaves, verificando níveis de água e funcionamento das válvulas de segurança.
- (C) usar técnica adequada ao quebrar ampolas de medicamento.
- (D) fazer aplicação de calor no limite máximo de 20 °C.
- (E) utilizar luva estéril ao realizar higiene corporal no paciente.

**67**

A ausência de circulação do sangue, provocada por uma parada cardiorrespiratória, interrompe a oxigenação dos tecidos, causando a morte das células mais sensíveis.

Os órgãos mais sensíveis à falta de oxigênio são:

- (A) cérebro e pulmão
- (B) cérebro e rim
- (C) cérebro e coração
- (D) pulmão e coração
- (E) coração e rim

**68**

Em um atendimento de emergência, na assistência a uma vítima de queimadura apresentando formação de flictenas (bolhas), o procedimento correto é:

- (A) aplicar pasta de dente para manter o local resfriado.
- (B) aplicar pomadas analgésicas para aliviar a dor.
- (C) retirar qualquer material que esteja grudado à pele.
- (D) furar as bolhas para facilitar a cicatrização.
- (E) não furar as bolhas para evitar infecção.

**69**

De acordo com a Norma Regulamentadora, relativa à Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, (NR 32), todos os profissionais atuantes neste segmento devem ser vacinados, gratuitamente, a partir de um Programa de Imunização Ativa de responsabilidade do Empregador, devidamente estabelecido no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), segundo as recomendações vigentes e determinadas pelo Ministério da Saúde, no tocante à sua aplicação.

Essas vacinas, em conformidade com a citada NR, são utilizadas para imunizar os trabalhadores contra as seguintes doenças:

- (A) tuberculose, tétano e hepatite A
- (B) tétano, difteria e hepatite B
- (C) difteria, *influenza* e hepatite B
- (D) febre amarela, hepatite C e tétano
- (E) febre amarela, *influenza* e tétano

**70**

As estatísticas oficiais reconhecem o recrudescimento da Tuberculose Pulmonar nas grandes metrópoles, e uma de suas principais causas reside no tratamento incompleto e/ou no abandono do tratamento específico por parte do paciente. Uma das medidas epidemiológicas adotadas é a vacinação precoce da criança com o BCG intradérmico.

Esse tipo de vacina deve ser aplicado

- (A) no recém-nato, em dose única
- (B) no recém-nato e com reforço aos dois meses
- (C) aos dois, quatro e seis meses de idade
- (D) aos três, cinco e sete meses de idade
- (E) aos seis meses de idade, em dose única

RASCUNHO