



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T1433051N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA SAÚDE

# MÉDICO (CIRURGIA PLÁSTICA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

**SUPERIOR**

Turno

**TARDE**

**PROVA**

**01**

**Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!**



**instituto  
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar  
Concursos Públicos é Crime!  
Previsto no art. 311 - A do  
Código Penal

## Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

## Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

## Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

## Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

## Língua Portuguesa

### **Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas**

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepam, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>. Acesso em: 04 jan. 2021.

**1**

**De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

**2**

**Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.**

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

**3**

**Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.**

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”

4

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém ‘pisou na bola’”.
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

5

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] se o paciente se engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

6

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

7

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

8

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- ( ) Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- ( ) No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- ( ) O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- ( ) As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- ( ) O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

9

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

10

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referenciação nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

## Matemática

11

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que  $\frac{3}{4}$  da dosagem total é da solução H,  $\frac{1}{5}$  da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

(A)  $\frac{1}{4}$

(B)  $\frac{15}{4}$

(C)  $\frac{1}{15}$

(D)  $\frac{4}{5}$

(E)  $\frac{4}{15}$

12

Cinco pessoas, identificadas como P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>4</sub> e P<sub>5</sub>, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P<sub>3</sub> e P<sub>4</sub> irão fazer o mesmo tipo de exame, P<sub>2</sub> e P<sub>5</sub> irão fazer exames de tipos diferentes e P<sub>2</sub> e P<sub>5</sub> irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P<sub>1</sub> irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P<sub>5</sub> irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P<sub>3</sub> irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P<sub>2</sub> irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P<sub>4</sub> irá fazer o exame de Glicemia.

13

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

14

Sendo  $p = \frac{7}{10}$ ,  $q = \frac{1}{50}$  e  $r = \frac{6}{7}$ , então o valor de  $\frac{2.p.r}{6.q}$  é igual a

- (A) 10
- (B)  $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D)  $\frac{1}{5}$
- (E) 5

**15**

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, \_\_\_).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

## **Informática**

**16**

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

**17**

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

**18**

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

19

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

20

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

## Conhecimentos Específicos

21

Sobre enxertos de pele, assinale a alternativa correta.

- (A) O fenômeno de contração primária é menor no enxerto de pele total, comparado ao enxerto de pele parcial.
- (B) Enxertos de pele total devem ser considerados em áreas funcionalmente ou esteticamente importantes (mãos e face, por exemplo).
- (C) O processo de revascularização se inicia na primeira hora após a enxertia.
- (D) A presença de hematoma entre a ferida e o enxerto não prejudica a sua integração.
- (E) A área doadora de enxertos de pele total é fechada por segunda intenção.

22

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto a enxertos.

- (A) Em enxertos de tendão, o tendão do músculo palmar longo é comumente utilizado.
- (B) O ílio é a área mais comumente utilizada para a coleta de enxertos ósseos.
- (C) Enxertos de ossos corticais são mais rapidamente integrados e revascularizados do que enxertos de ossos esponjosos.
- (D) O nervo sural é a fonte mais comum de enxerto autólogo de nervos.
- (E) Ao escolher nervos doadores para transferência, um grupo de músculos sinérgicos pode ser preferencial, no intuito de facilitar a re-educação pós-operatória.

23

Qual artéria tem seu suprimento sanguíneo advindo da artéria carótida interna?

- (A) Artéria labial inferior.
- (B) Artéria maxilar interna.
- (C) Artéria temporal superficial.
- (D) Artéria supratrocLEAR.
- (E) Artéria auricular posterior.

**24**

**Em relação ao fenômeno de retardo ou autonomização de retalhos, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Trata-se de um artifício cirúrgico que pode ser executado através da elevação parcial ou total de um retalho.
- (B) Seu efeito fisiológico é o aumento das artérias existentes ao longo do eixo de um retalho.
- (C) Tal procedimento deve ser executado em um único tempo cirúrgico.
- (D) Seu maior objetivo é fornecer um retalho mais seguro e longo.
- (E) É um procedimento permanente e irreversível.

**25**

**Em relação à classificação dos músculos com base no seu suprimento nervoso motor (Classificação de Taylor), assinale a alternativa correta.**

- (A) O tipo I tem como exemplo o músculo grande dorsal e é caracterizado por apresentar um nervo que se divide antes de entrar no músculo.
- (B) O tipo II tem como exemplo o músculo glúteo máximo e apresenta várias ramificações nervosas oriundas de um mesmo tronco nervoso.
- (C) O tipo III tem como exemplo o músculo trapézio e apresenta ramificações múltiplas oriundas de um mesmo tronco nervoso.
- (D) O tipo III tem como exemplo o músculo gastrocnêmio e apresenta um nervo único não ramificado antes de entrar no músculo.
- (E) O tipo IV tem como exemplo o músculo reto-abdominal e apresenta ramificações múltiplas oriundas de diferentes troncos nervosos.

**26**

**Quais são os retalhos musculares tipo II na classificação de Mathes e Nahai?**

- (A) Tensor da fáscia lata e gastrocnêmio.
- (B) Sóleo e grácil.
- (C) Glúteo Máximo e peitoral menor.
- (D) Sartório e tibial anterior.
- (E) Grande dorsal e peitoral maior.

**27**

**Em paciente submetido à zetaplastia com dois retalhos de comprimentos iguais e com ângulos de borda laterais de 75 graus, haverá um ganho teórico de comprimento da sua borda central de**

- (A) 25%.
- (B) 50%.
- (C) 75%.
- (D) 100%.
- (E) 125%.

**28**

**Considerando a microperfusão tecidual, qual das seguintes substâncias está relacionada à vasodilatação?**

- (A) Bradicininina.
- (B) Angiotensina II.
- (C) Endotelina I.
- (D) Espécies reativas de oxigênio.
- (E) Adrenalina.

**29**

**Qual substância está relacionada a reações de anabolismo na resposta endócrino metabólica ao trauma?**

- (A) Interleucina I.
- (B) Cortisol.
- (C) Glucagon.
- (D) Somatomedina C.
- (E) Fator de necrose tumoral.

**30**

**Qual condição NÃO está relacionada à perda de um retalho microcirúrgico?**

- (A) Temperatura corporal acima de 36°C.
- (B) Hipotensão.
- (C) Hipovolemia.
- (D) Compressão externa.
- (E) Resposta simpática à dor.

**31****Sobre o retalho antebraquial microcirúrgico, assinale a alternativa correta.**

- (A) Apresenta como pedículo vascular dominante a artéria ulnar.
- (B) Na síndrome de Mobius, o transplante microcirúrgico do retalho antebraquial é a opção de tratamento mais utilizada.
- (C) Em reconstruções penianas totais, seu uso é frequente, sendo realizada a anastomose do nervo antebraquial com o nervo ílio-inguinal.
- (D) Seu pedículo arterial e venoso se encontra na face extensora do antebraço.
- (E) Não é utilizado em reconstruções do pé devido à distância e às diferentes texturas de pele.

**32****Durante a expansão tecidual realizada por expansores, qual dos seguintes tecidos apresenta um maior aumento de espessura?**

- (A) Derme.
- (B) Tecido muscular.
- (C) Tecido ósseo.
- (D) Tecido celular subcutâneo.
- (E) Epiderme.

**33****Em relação aos expansores, assinale a alternativa correta.**

- (A) Válvulas devem ser alocadas em regiões corporais que não sofram pressões diretas conforme o paciente altere a sua posição.
- (B) Com o objetivo de diminuir a incidência de hematoma e seroma, deve-se iniciar a primeira expansão três semanas após a colocação do dispositivo.
- (C) O prazo limite para o uso de um expansor tecidual, independentemente da topografia, é de 3 meses.
- (D) Exposição precoce é melhor tratada através do uso de antibioticoterapia e curativos tipo compressivos.
- (E) Diferentes tolerâncias algicas não alteram o volume infundido.

**34****Um bom planejamento pré-operatório na colocação de expansores visa às seguintes situações, EXCETO**

- (A) incisões que se aloquem nas margens dos retalhos finais.
- (B) cápsula remanescente com presença de calcificações.
- (C) unidade estética reconstruída.
- (D) cicatrizes em posições minimamente aparentes.
- (E) linhas de tensão reduzidas.

**35****Sobre grandes queimados e sua fisiopatologia, assinale a alternativa correta.**

- (A) O choque instituído por queimadura é totalmente revertido por reposição volêmica.
- (B) Aumento na resistência vascular pulmonar e sistêmica, além de diminuição do débito cardíaco, são alterações decorrentes do choque.
- (C) Há um extravasamento capilar nas regiões danificadas pela lesão térmica, sendo tal processo poupado nas áreas corporais em que não houve lesão.
- (D) Laboratorialmente, na fase aguda, ocorre uma diminuição dos níveis de hematócrito.
- (E) Cortisol, insulina e ACTH encontram-se aumentados na fase aguda de uma queimadura.

**36****São características das queimaduras de terceiro grau, EXCETO**

- (A) ausência de cicatrização espontânea em lesões extensas.
- (B) presença de lesão marmórea e endurecida, sem perfusão capilar.
- (C) ausência de lesões bolhosas.
- (D) usualmente são extremamente dolorosas.
- (E) atingem camadas mais profundas do que a pele.

- 37**  
**Em relação à regra de Wallace (regra dos 9), assinale os dois segmentos corpóreos que apresentam diferentes porcentagens entre adultos e crianças.**
- (A) Membro superior e membro inferior.  
(B) Cabeça e membro superior.  
(C) Membro superior e tronco.  
(D) Cabeça e tronco.  
(E) Cabeça e membro inferior.
- 38**  
**Em caso de paciente vítima de queimadura que apresenta inalação de substâncias, são indicações de intubação orotraqueal devido a lesão por inalação, EXCETO**
- (A) estridor e taquipneia.  
(B) alteração na voz e rouquidão.  
(C) eritema e edema de orofaringe.  
(D) hipotensão e taquicardia.  
(E) partículas carbonáceas na face do paciente.
- 39**  
**Qual é o nome da região que circunda a queimadura e apresenta um tecido lesado, mas potencialmente recuperável caso não haja a persistência de insultos?**
- (A) Zona de Coagulação.  
(B) Zona de Hiperemia.  
(C) Zona de Estase.  
(D) Zona de Maturação.  
(E) Zona de Convergência.
- 40**  
**Qual substituto temporário de pele em queimados utiliza a pele de cadáver humanos?**
- (A) Aloenxerto.  
(B) Membrana Amniótica.  
(C) Xenoenxerto.  
(D) Duoderme.  
(E) Derme Alogênica.
- 41**  
**Em pacientes com presença de feridas crônicas provenientes de úlcera de pressão e osteomielite, que acabaram sofrendo degeneração maligna caracterizada pelo nome de úlcera de Marjolin, em qual tipo histológico é mais provável que tal tumor se desenvolva?**
- (A) Carcinoma espinocelular.  
(B) Carcinoma basocelular.  
(C) Melanoma maligno.  
(D) Sarcoma.  
(E) Teratoma.
- 42**  
**Em paciente com uma ferida aberta, qual é a célula que apresenta a função principal no fenômeno de contração?**
- (A) Miofibroblasto.  
(B) Condrócito.  
(C) Neutrófilo.  
(D) Plasmócito.  
(E) Macrófago.
- 43**  
**Em paciente com presença de sinostose da sutura sagital, aumento da distância anteroposterior e diminuição do diâmetro bi-temporal, o quadro corresponde a**
- (A) plagiocefalia.  
(B) escafocefalia.  
(C) trigonocefalia.  
(D) braquicefalia.  
(E) normocefalia.
- 44**  
**Paciente com craniossinostose caracterizada por apresentar sindactilia nas mãos e pés é característico de**
- (A) síndrome de Apert.  
(B) síndrome de Pfeiffer.  
(C) síndrome de Crouzon.  
(D) síndrome de Treacher Collins.  
(E) síndrome de Jackson-Weiss.

45

**Pacientes com a sequência de Pierre Robin apresentam qual tríade clínica clássica?**

- (A) Hipertelorismo, retrognatia, fissura palatina.
- (B) Glossoptose, hipertelorismo, comunicação interventricular.
- (C) Retrognatismo, obstrução das vias aéreas, glossoptose.
- (D) Fissura palatina, enoftalmia, glossoptose.
- (E) Enoftalmia, hipertelorismo, retrognatia.

46

**Sobre a palatoplastia de Furlow, assinale a alternativa correta.**

- (A) Apresenta uma liberação dos retalhos, de modo que estes se encontram bipediculados.
- (B) Os retalhos são liberados em sua porção anterior, com alongamento em V-Y do palato.
- (C) Apresenta a confecção de três retalhos de formatos piramidais, resultando em alongamento do palato em V-Y.
- (D) É a transposição de retalhos miomucosos do músculo salpingofaríngeo.
- (E) Tem como base cirúrgica uma dupla zetaplastia reversa e resulta no aumento do comprimento do palato.

47

**Paciente vítima de ferimento com arma branca, em face volar de mão, apresenta as seguintes características ao exame físico: parestesia de quinto dedo e de metade de quarto dedo, incapacidade de adução do polegar. Esse quadro clínico representa a lesão de qual nervo?**

- (A) Nervo mediano.
- (B) Nervo ulnar.
- (C) Nervo radial.
- (D) Nervo interósseo anterior.
- (E) Nervo interósseo posterior.

48

**É mais comumente associado ao desenvolvimento da doença de Dupuytren**

- (A) sexo feminino.
- (B) ser negro.
- (C) doença de Ledderhose.
- (D) início na primeira ou segunda década de vida.
- (E) priaprismo concomitante.

49

**Em caso de paciente vítima de trauma com perda de substancia no nível do joelho e exposição óssea e articular, qual é a melhor conduta?**

- (A) Retalho do músculo gastrocnêmio.
- (B) Retalho do músculo tensor da fáscia lata.
- (C) Retalho miocutâneo do músculo sóleo.
- (D) Retalho em cross-leg.
- (E) Enxerto de pele total.

50

**São fatores de risco para o retalho músculo-cutâneo abdominal na reconstrução de mama, EXCETO**

- (A) diabetes descompensada.
- (B) tabagismo.
- (C) incisão infraumbilical mediana prévia.
- (D) obesidade mórbida.
- (E) dermolipectomia abdominal prévia.

**51**

**Sobre grandes queimados, assinale a alternativa correta.**

- (A) As úlceras gastrointestinais do grande queimado são potencializadas pela isquemia da mucosa e podem ocorrer após 24h da queimadura.
- (B) Endoscopia de um paciente com mais de 40% de área corporal queimada pode revelar um grande número de lesões, denominadas úlceras de Cushing.
- (C) Desde o início, uma queimadura deve ser considerada como infectada, sendo prescrito antibiótico.
- (D) Uma lesão inalatória não ocorre sem queimadura de face.
- (E) A intoxicação por monóxido de carbono, com níveis de carboxi-hemoglobina até 30%, não apresenta ainda início de sintomatologia.

**52**

**Um paciente de 25 anos foi vítima de trauma grave, necessitando intubação e cuidados intensivos durante 21 dias. Evoluiu com úlcera sacral de 3x5 cm e, no momento, apresenta previsão de alta hospitalar, sem sequela motora ou neurológica. Diante de tal quadro clínico, qual conduta é a menos apropriada para a cobertura da úlcera existente?**

- (A) Fechamento por segunda intenção.
- (B) Excisão e fechamento primário.
- (C) Retalho fáscio-cutâneo.
- (D) Retalho músculo-cutâneo do músculo glúteo máximo.
- (E) Retalho cutâneo.

**53**

**Sobre a classificação de BI-RADS, assinale a alternativa correta.**

- (A) BI-RADS 0 e 1 demonstram benignidade e não necessitam de avaliação ou exame complementar.
- (B) BI-RADS 2 condiz com achado provavelmente benigno, sendo necessário acompanhamento de 6/6 meses.
- (C) BI-RADS 3 recomenda biópsia de imediato.
- (D) O propósito da classificação de BI-RADS, na mamografia, no screening, é aumentar a indicação de biópsias clinicamente ocultas e a consequente detecção de tumores precoces.
- (E) BI-RADS 5 já apresenta biópsia comprovada de câncer de mama.

**54**

**Para paciente com quadro de osteomielite esternal pós-revascularização miocárdica, qual é a alternativa correta em relação à cobertura?**

- (A) Retalho do músculo grande dorsal baseado na artéria epigástrica superior.
- (B) Retalho músculo-cutâneo do reto-abdominal baseado na artéria circunflexa femoral lateral.
- (C) Retalho muscular do peitoral maior baseado na artéria tóraco-acromial.
- (D) Retalho serrátil anterior irrigado pela artéria torácica lateral.
- (E) Retalho do músculo platíma baseado na artéria escapular superior.

**55**

**Sobre o ligamento de Cooper, é correto afirmar que**

- (A) dá sustentação na ritidoplastia à plicatura do smas-platíma.
- (B) ajuda o músculo de Muller na elevação da pálpebra superior.
- (C) quando lesado, apresenta deformidade em pescoço de cisne.
- (D) abaixa a ponta do nariz ao sorrir.
- (E) é importante para o suporte das mamas.

**56**

**Em relação à reconstrução de mama utilizando o retalho do músculo grande dorsal, assinale a alternativa correta.**

- (A) Apresenta como contraindicação pacientes com toracotomia posteroanterior em que o músculo foi dividido.
- (B) Tem como pedículo dominante a artéria circunflexa da escápula.
- (C) A secção do nervo escapular não causa dificuldades técnicas em uma reconstrução futura.
- (D) Por se tratar de um músculo que se encontra na classificação número 3 de Mathes e Nahai, seu retalho é muito seguro.
- (E) Não é possível realizar uma reconstrução utilizando apenas tecido autólogo, sendo necessária a associação com implantes.

**57**

**Sobre o retalho TRAM microcirúrgico, assinale a alternativa correta.**

- (A) Tem maior eficiência vascular que o pediculado, pois é nutrido pela artéria epigástrica superior.
- (B) Tem maior modelagem na nova mama, pois pode ser reposicionado livremente na parede torácica.
- (C) Em uma reconstrução tardia, geralmente se utilizam como vaso receptor os vasos toracodorsais, pela maior facilidade da região axilar já dissecada em cirurgia prévia.
- (D) Tem maior agressão à parede abdominal devido ao maior tempo cirúrgico e manipulação local.
- (E) Em reconstruções bilaterais pós-mastectomias, o tempo cirúrgico não se torna fator limitante.

**58**

**Em relação à reconstrução de membro inferior, assinale a alternativa correta.**

- (A) O músculo solear é o maior músculo da perna e, por ter a irrigação tipo I (Nahai), é indicado para a cobertura do joelho.
- (B) O músculo grácil é irrigado pela artéria circunflexa femoral medial.
- (C) O gastrocnêmio apresenta dupla irrigação pela artéria sural medial e lateral, sendo considerado um tipo III (Nahai).
- (D) Retalhos musculares são contraindicados em tratamento de osteomielite de perna devido à boa efetividade através de retalhos fásquio-cutâneos.
- (E) A perna apresenta 3 compartimentos denominados anterior, posterior e medial.

**59**

**Sobre a reconstrução de defeitos vaginais congênitos e adquiridos, assinale a alternativa correta.**

- (A) A técnica de Mc Indoe corresponde a dois retalhos provenientes da região pudenda.
- (B) A técnica de Cingapura corresponde à dilatação seguida de um enxerto parcial de pele.
- (C) O retalho do músculo grácil é indicado para a reconstrução de defeitos vaginais circunferenciais, tendo uma maior taxa de perda comparado ao VRAM.
- (D) Jejunos e cólon sigmoide podem ser utilizados sem apresentar queixas futuras de secreção desagradável ou odor excessivo.
- (E) O retalho VRAM fica pediculado na artéria epigástrica superior.

**60**

**O Suprimento arterial da mama principal se dá através de ramos de três vasos que são:**

- (A) artéria epigástrica superior, artéria torácica lateral e artéria torácica interna.
- (B) artéria torácica superior, artéria torácica lateral e artérias intercostais.
- (C) artéria epigástrica superior, artérias intercostais e artéria torácica superior.
- (D) artéria torácica lateral, artéria mamária interna e artéria tóraco-acromial.
- (E) artéria torácica interna, artéria torácica lateral e artérias intercostais.

Realização



**instituto aacp**



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T2433051N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA SAÚDE

# MÉDICO (CIRURGIA PLÁSTICA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

**SUPERIOR**

Turno

**TARDE**

**PROVA**

**02**

**Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!**



**instituto  
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar  
Concursos Públicos é Crime!  
Previsto no art. 311 - A do  
Código Penal

## Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

## Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

## Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

## Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

## Língua Portuguesa

### **Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas**

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>.

Acesso em: 04 jan. 2021.

1

**Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.**

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

2

**Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.**

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

3

**Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.**

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém ‘pisou na bola’.”.
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”.
- (C) “Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

4

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] se o paciente se engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

5

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

6

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

7

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- ( ) Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- ( ) No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- ( ) O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- ( ) As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- ( ) O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

8

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

9

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referência nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

10

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

## Matemática

11

Cinco pessoas, identificadas como  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  e  $P_5$ , estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que  $P_3$  e  $P_4$  irão fazer o mesmo tipo de exame,  $P_2$  e  $P_5$  irão fazer exames de tipos diferentes e  $P_2$  e  $P_5$  irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A)  $P_1$  irá fazer o exame de Glicemia.
- (B)  $P_5$  irá fazer o exame de Hemograma.
- (C)  $P_3$  irá fazer o exame de Hemograma.
- (D)  $P_2$  irá fazer o exame de Glicemia.
- (E)  $P_4$  irá fazer o exame de Glicemia.

12

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

13

Se  $p = \frac{7}{10}$ ,  $q = \frac{1}{50}$  e  $r = \frac{6}{7}$ , então o valor de  $\frac{2.p.r}{6.q}$  é igual a

- (A) 10
- (B)  $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D)  $\frac{1}{5}$
- (E) 5

14

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, \_\_\_).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

15

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que  $\frac{3}{4}$  da

dosagem total é da solução H,  $\frac{1}{5}$  da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A)  $\frac{1}{4}$
- (B)  $\frac{15}{4}$
- (C)  $\frac{1}{15}$
- (D)  $\frac{4}{5}$
- (E)  $\frac{4}{15}$

## Informática

16

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

17

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

18

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

**19**

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

**20**

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

## **Conhecimentos Específicos**

**21**

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto a enxertos.

- (A) Em enxertos de tendão, o tendão do músculo palmar longo é comumente utilizado.
- (B) O ílio é a área mais comumente utilizada para a coleta de enxertos ósseos.
- (C) Enxertos de ossos corticais são mais rapidamente integrados e revascularizados do que enxertos de ossos esponjosos.
- (D) O nervo sural é a fonte mais comum de enxerto autólogo de nervos.
- (E) Ao escolher nervos doadores para transferência, um grupo de músculos sinérgicos pode ser preferencial, no intuito de facilitar a re-educação pós-operatória.

**22**

Qual artéria tem seu suprimento sanguíneo advindo da artéria carótida interna?

- (A) Artéria labial inferior.
- (B) Artéria maxilar interna.
- (C) Artéria temporal superficial.
- (D) Artéria supratrocLEAR.
- (E) Artéria auricular posterior.

**23**

Em relação ao fenômeno de retardo ou autonomização de retalhos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Trata-se de um artifício cirúrgico que pode ser executado através da elevação parcial ou total de um retalho.
- (B) Seu efeito fisiológico é o aumento das artérias existentes ao longo do eixo de um retalho.
- (C) Tal procedimento deve ser executado em um único tempo cirúrgico.
- (D) Seu maior objetivo é fornecer um retalho mais seguro e longo.
- (E) É um procedimento permanente e irreversível.

**24**

**Em relação à classificação dos músculos com base no seu suprimento nervoso motor (Classificação de Taylor), assinale a alternativa correta.**

- (A) O tipo I tem como exemplo o músculo grande dorsal e é caracterizado por apresentar um nervo que se divide antes de entrar no músculo.
- (B) O tipo II tem como exemplo o músculo glúteo máximo e apresenta várias ramificações nervosas oriundas de um mesmo tronco nervoso.
- (C) O tipo III tem como exemplo o músculo trapézio e apresenta ramificações múltiplas oriundas de um mesmo tronco nervoso.
- (D) O tipo III tem como exemplo o músculo gastrocnêmio e apresenta um nervo único não ramificado antes de entrar no músculo.
- (E) O tipo IV tem como exemplo o músculo reto-abdominal e apresenta ramificações múltiplas oriundas de diferentes troncos nervosos.

**25**

**Quais são os retalhos musculares tipo II na classificação de Mathes e Nahai?**

- (A) Tensor da fáscia lata e gastrocnêmio.
- (B) Sóleo e grácil.
- (C) Glúteo Máximo e peitoral menor.
- (D) Sartório e tibial anterior.
- (E) Grande dorsal e peitoral maior.

**26**

**Em paciente submetido à zetaplastia com dois retalhos de comprimentos iguais e com ângulos de borda laterais de 75 graus, haverá um ganho teórico de comprimento da sua borda central de**

- (A) 25%.
- (B) 50%.
- (C) 75%.
- (D) 100%.
- (E) 125%.

**27**

**Considerando a microperfusão tecidual, qual das seguintes substâncias está relacionada à vasodilatação?**

- (A) Bradicinina.
- (B) Angiotensina II.
- (C) Endotelina I.
- (D) Espécies reativas de oxigênio.
- (E) Adrenalina.

**28**

**Qual substância está relacionada a reações de anabolismo na resposta endócrino metabólica ao trauma?**

- (A) Interleucina I.
- (B) Cortisol.
- (C) Glucagon.
- (D) Somatomedina C.
- (E) Fator de necrose tumoral.

**29**

**Qual condição NÃO está relacionada à perda de um retalho microcirúrgico?**

- (A) Temperatura corporal acima de 36°C.
- (B) Hipotensão.
- (C) Hipovolemia.
- (D) Compressão externa.
- (E) Resposta simpática à dor.

**30**

**Sobre o retalho antebraquial microcirúrgico, assinale a alternativa correta.**

- (A) Apresenta como pedículo vascular dominante a artéria ulnar.
- (B) Na síndrome de Mobius, o transplante microcirúrgico do retalho antebraquial é a opção de tratamento mais utilizada.
- (C) Em reconstruções penianas totais, seu uso é frequente, sendo realizada a anastomose do nervo antebraquial com o nervo ílio-inguinal.
- (D) Seu pedículo arterial e venoso se encontra na face extensora do antebraço.
- (E) Não é utilizado em reconstruções do pé devido à distância e às diferentes texturas de pele.

**31**

**Durante a expansão tecidual realizada por expansores, qual dos seguintes tecidos apresenta um maior aumento de espessura?**

- (A) Derme.
- (B) Tecido muscular.
- (C) Tecido ósseo.
- (D) Tecido celular subcutâneo.
- (E) Epiderme.

**32**

**Em relação aos expansores, assinale a alternativa correta.**

- (A) Válvulas devem ser alocadas em regiões corporais que não sofram pressões diretas conforme o paciente altere a sua posição.
- (B) Com o objetivo de diminuir a incidência de hematoma e seroma, deve-se iniciar a primeira expansão três semanas após a colocação do dispositivo.
- (C) O prazo limite para o uso de um expansor tecidual, independentemente da topografia, é de 3 meses.
- (D) Exposição precoce é melhor tratada através do uso de antibioticoterapia e curativos tipo compressivos.
- (E) Diferentes tolerâncias algicas não alteram o volume infundido.

**33**

**Um bom planejamento pré-operatório na colocação de expansores visa às seguintes situações, EXCETO**

- (A) incisões que se aloquem nas margens dos retalhos finais.
- (B) cápsula remanescente com presença de calcificações.
- (C) unidade estética reconstruída.
- (D) cicatrizes em posições minimamente aparentes.
- (E) linhas de tensão reduzidas.

**34**

**Sobre grandes queimados e sua fisiopatologia, assinale a alternativa correta.**

- (A) O choque instituído por queimadura é totalmente revertido por reposição volêmica.
- (B) Aumento na resistência vascular pulmonar e sistêmica, além de diminuição do débito cardíaco, são alterações decorrentes do choque.
- (C) Há um extravasamento capilar nas regiões danificadas pela lesão térmica, sendo tal processo poupado nas áreas corporais em que não houve lesão.
- (D) Laboratorialmente, na fase aguda, ocorre uma diminuição dos níveis de hematócrito.
- (E) Cortisol, insulina e ACTH encontram-se aumentados na fase aguda de uma queimadura.

**35**

**São características das queimaduras de terceiro grau, EXCETO**

- (A) ausência de cicatrização espontânea em lesões extensas.
- (B) presença de lesão marmórea e endurecida, sem perfusão capilar.
- (C) ausência de lesões bolhosas.
- (D) usualmente são extremamente dolorosas.
- (E) atingem camadas mais profundas do que a pele.

**36**

**Em relação à regra de Wallace (regra dos 9), assinale os dois segmentos corpóreos que apresentam diferentes porcentagens entre adultos e crianças.**

- (A) Membro superior e membro inferior.
- (B) Cabeça e membro superior.
- (C) Membro superior e tronco.
- (D) Cabeça e tronco.
- (E) Cabeça e membro inferior.

**37**

**Em caso de paciente vítima de queimadura que apresenta inalação de substâncias, são indicações de intubação orotraqueal devido a lesão por inalação, EXCETO**

- (A) estridor e taquipneia.
- (B) alteração na voz e rouquidão.
- (C) eritema e edema de orofaringe.
- (D) hipotensão e taquicardia.
- (E) partículas carbonáceas na face do paciente.

**38**

**Qual é o nome da região que circunda a queimadura e apresenta um tecido lesado, mas potencialmente recuperável caso não haja a persistência de insultos?**

- (A) Zona de Coagulação.
- (B) Zona de Hiperemia.
- (C) Zona de Estase.
- (D) Zona de Maturação.
- (E) Zona de Convergência.

**39**

**Qual substituto temporário de pele em queimados utiliza a pele de cadáver humanos?**

- (A) Aloenxerto.
- (B) Membrana Amniótica.
- (C) Xenoenxerto.
- (D) Duoderme.
- (E) Derme Alogênica.

**40**

**Em pacientes com presença de feridas crônicas provenientes de úlcera de pressão e osteomielite, que acabaram sofrendo degeneração maligna caracterizada pelo nome de úlcera de Marjolin, em qual tipo histológico é mais provável que tal tumor se desenvolva?**

- (A) Carcinoma espinocelular.
- (B) Carcinoma basocelular.
- (C) Melanoma maligno.
- (D) Sarcoma.
- (E) Teratoma.

**41**

**Em paciente com uma ferida aberta, qual é a célula que apresenta a função principal no fenômeno de contração?**

- (A) Miofibroblasto.
- (B) Condrócito.
- (C) Neutrófilo.
- (D) Plasmócito.
- (E) Macrófago.

**42**

**Em paciente com presença de sinostose da sutura sagital, aumento da distância anteroposterior e diminuição do diâmetro bi-temporal, o quadro corresponde a**

- (A) plagiocefalia.
- (B) escafocefalia.
- (C) trigonocefalia.
- (D) braquicefalia.
- (E) normocefalia.

**43**

**Paciente com craniossinostose caracterizada por apresentar sindactilia nas mãos e pés é característico de**

- (A) síndrome de Apert.
- (B) síndrome de Pfeiffer.
- (C) síndrome de Crouzon.
- (D) síndrome de Treacher Collins.
- (E) síndrome de Jackson-Weiss.

**44**

**Pacientes com a sequência de Pierre Robin apresentam qual tríade clínica clássica?**

- (A) Hipertelorismo, retrognatia, fissura palatina.
- (B) Glossoptose, hipertelorismo, comunicação interventricular.
- (C) Retrognatismo, obstrução das vias aéreas, glossoptose.
- (D) Fissura palatina, enoftalmia, glossoptose.
- (E) Enoftalmia, hipertelorismo, retrognatia.

**45****Sobre a palatoplastia de Furlow, assinale a alternativa correta.**

- (A) Apresenta uma liberação dos retalhos, de modo que estes se encontram bipediculados.
- (B) Os retalhos são liberados em sua porção anterior, com alongamento em V-Y do palato.
- (C) Apresenta a confecção de três retalhos de formatos piramidais, resultando em alongamento do palato em V-Y.
- (D) É a transposição de retalhos miomucosos do músculo salpingofaríngeo.
- (E) Tem como base cirúrgica uma dupla zetaplastia reversa e resulta no aumento do comprimento do palato.

**46****Paciente vítima de ferimento com arma branca, em face volar de mão, apresenta as seguintes características ao exame físico: parestesia de quinto dedo e de metade de quarto dedo, incapacidade de adução do polegar. Esse quadro clínico representa a lesão de qual nervo?**

- (A) Nervo mediano.
- (B) Nervo ulnar.
- (C) Nervo radial.
- (D) Nervo interósseo anterior.
- (E) Nervo interósseo posterior.

**47****É mais comumente associado ao desenvolvimento da doença de Dupuytren**

- (A) sexo feminino.
- (B) ser negro.
- (C) doença de Ledderhose.
- (D) início na primeira ou segunda década de vida.
- (E) priaprismo concomitante.

**48****Em caso de paciente vítima de trauma com perda de substância no nível do joelho e exposição óssea e articular, qual é a melhor conduta?**

- (A) Retalho do músculo gastrocnêmio.
- (B) Retalho do músculo tensor da fáscia lata.
- (C) Retalho miocutâneo do músculo sóleo.
- (D) Retalho em cross-leg.
- (E) Enxerto de pele total.

**49****São fatores de risco para o retalho músculo-cutâneo abdominal na reconstrução de mama, EXCETO**

- (A) diabetes descompensada.
- (B) tabagismo.
- (C) incisão infraumbilical mediana prévia.
- (D) obesidade mórbida.
- (E) dermolipectomia abdominal prévia.

**50****Sobre grandes queimados, assinale a alternativa correta.**

- (A) As úlceras gastrointestinais do grande queimado são potencializadas pela isquemia da mucosa e podem ocorrer após 24h da queimadura.
- (B) Endoscopia de um paciente com mais de 40% de área corporal queimada pode revelar um grande número de lesões, denominadas úlceras de Cushing.
- (C) Desde o início, uma queimadura deve ser considerada como infectada, sendo prescrito antibiótico.
- (D) Uma lesão inalatória não ocorre sem queimadura de face.
- (E) A intoxicação por monóxido de carbono, com níveis de carboxi-hemoglobina até 30%, não apresenta ainda início de sintomatologia.

**51**

**Um paciente de 25 anos foi vítima de trauma grave, necessitando intubação e cuidados intensivos durante 21 dias. Evoluiu com úlcera sacral de 3x5 cm e, no momento, apresenta previsão de alta hospitalar, sem sequela motora ou neurológica. Diante de tal quadro clínico, qual conduta é a menos apropriada para a cobertura da úlcera existente?**

- (A) Fechamento por segunda intenção.
- (B) Excisão e fechamento primário.
- (C) Retalho fáscio-cutâneo.
- (D) Retalho músculo-cutâneo do músculo glúteo máximo.
- (E) Retalho cutâneo.

**52**

**Sobre a classificação de BI-RADS, assinale a alternativa correta.**

- (A) BI-RADS 0 e 1 demonstram benignidade e não necessitam de avaliação ou exame complementar.
- (B) BI-RADS 2 condiz com achado provavelmente benigno, sendo necessário acompanhamento de 6/6 meses.
- (C) BI-RADS 3 recomenda biópsia de imediato.
- (D) O propósito da classificação de BI-RADS, na mamografia, no screening, é aumentar a indicação de biópsias clinicamente ocultas e a consequente detecção de tumores precoces.
- (E) BI-RADS 5 já apresenta biópsia comprovada de câncer de mama.

**53**

**Para paciente com quadro de osteomielite esternal pós-revascularização miocárdica, qual é a alternativa correta em relação à cobertura?**

- (A) Retalho do músculo grande dorsal baseado na artéria epigástrica superior.
- (B) Retalho músculo-cutâneo do reto-abdominal baseado na artéria circunflexa femoral lateral.
- (C) Retalho muscular do peitoral maior baseado na artéria tóraco-acromial.
- (D) Retalho serrátil anterior irrigado pela artéria torácica lateral.
- (E) Retalho do músculo platisma baseado na artéria escapular superior.

**54**

**Sobre o ligamento de Cooper, é correto afirmar que**

- (A) dá sustentação na ritidoplastia à plicatura do smas-platisma.
- (B) ajuda o músculo de Muller na elevação da pálpebra superior.
- (C) quando lesado, apresenta deformidade em pescoço de cisne.
- (D) abaixa a ponta do nariz ao sorrir.
- (E) é importante para o suporte das mamas.

**55**

**Em relação à reconstrução de mama utilizando o retalho do músculo grande dorsal, assinale a alternativa correta.**

- (A) Apresenta como contraindicação pacientes com toracotomia posteroanterior em que o músculo foi dividido.
- (B) Tem como pedículo dominante a artéria circunflexa da escápula.
- (C) A secção do nervo escapular não causa dificuldades técnicas em uma reconstrução futura.
- (D) Por se tratar de um músculo que se encontra na classificação número 3 de Mathes e Nahai, seu retalho é muito seguro.
- (E) Não é possível realizar uma reconstrução utilizando apenas tecido autólogo, sendo necessária a associação com implantes.

**56**

**Sobre o retalho TRAM microcirúrgico, assinale a alternativa correta.**

- (A) Tem maior eficiência vascular que o pediculado, pois é nutrido pela artéria epigástrica superior.
- (B) Tem maior modelagem na nova mama, pois pode ser reposicionado livremente na parede torácica.
- (C) Em uma reconstrução tardia, geralmente se utilizam como vaso receptor os vasos toracodorsais, pela maior facilidade da região axilar já dissecada em cirurgia prévia.
- (D) Tem maior agressão à parede abdominal devido ao maior tempo cirúrgico e manipulação local.
- (E) Em reconstruções bilaterais pós-mastectomias, o tempo cirúrgico não se torna fator limitante.

**57**

**Em relação à reconstrução de membro inferior, assinale a alternativa correta.**

- (A) O músculo solear é o maior músculo da perna e, por ter a irrigação tipo I (Nahai), é indicado para a cobertura do joelho.
- (B) O músculo grácil é irrigado pela artéria circunflexa femoral medial.
- (C) O gastrocnêmio apresenta dupla irrigação pela artéria sural medial e lateral, sendo considerado um tipo III (Nahai).
- (D) Retalhos musculares são contraindicados em tratamento de osteomielite de perna devido à boa efetividade através de retalhos fásquio-cutâneos.
- (E) A perna apresenta 3 compartimentos denominados anterior, posterior e medial.

**58**

**Sobre a reconstrução de defeitos vaginais congênitos e adquiridos, assinale a alternativa correta.**

- (A) A técnica de Mc Indoe corresponde a dois retalhos provenientes da região pudenda.
- (B) A técnica de Cingapura corresponde à dilatação seguida de um enxerto parcial de pele.
- (C) O retalho do músculo grácil é indicado para a reconstrução de defeitos vaginais circunferenciais, tendo uma maior taxa de perda comparado ao VRAM.
- (D) Jejunum e cólon sigmoide podem ser utilizados sem apresentar queixas futuras de secreção desagradável ou odor excessivo.
- (E) O retalho VRAM fica pediculado na artéria epigástrica superior.

**59**

**O Suprimento arterial da mama principal se dá através de ramos de três vasos que são:**

- (A) artéria epigástrica superior, artéria torácica lateral e artéria torácica interna.
- (B) artéria torácica superior, artéria torácica lateral e artérias intercostais.
- (C) artéria epigástrica superior, artérias intercostais e artéria torácica superior.
- (D) artéria torácica lateral, artéria mamária interna e artéria tóraco-acromial.
- (E) artéria torácica interna, artéria torácica lateral e artérias intercostais.

**60**

**Sobre enxertos de pele, assinale a alternativa correta.**

- (A) O fenômeno de contração primária é menor no enxerto de pele total, comparado ao enxerto de pele parcial.
- (B) Enxertos de pele total devem ser considerados em áreas funcionalmente ou esteticamente importantes (mãos e face, por exemplo).
- (C) O processo de revascularização se inicia na primeira hora após a enxertia.
- (D) A presença de hematoma entre a ferida e o enxerto não prejudica a sua integração.
- (E) A área doadora de enxertos de pele total é fechada por segunda intenção.

Realização



**instituto aocp**



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T3433051N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA SAÚDE

# MÉDICO (CIRURGIA PLÁSTICA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

**SUPERIOR**

Turno

**TARDE**

**PROVA**

**03**

**Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!**



**instituto  
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar  
Concursos Públicos é Crime!  
Previsto no art. 311 - A do  
Código Penal

## Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

## Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

## Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

## Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

## Língua Portuguesa

### **Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas**

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>. Acesso em: 04 jan. 2021.

1

**Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.**

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”

2

**Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.**

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**.”
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”

3

**Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.**

**“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”**

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

4

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

5

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

6

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- ( ) Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- ( ) No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- ( ) O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- ( ) As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- ( ) O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

7

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

**8**

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referência nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

**9**

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

**10**

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

**Matemática**

11

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

12

Se  $p = \frac{7}{10}$ ,  $q = \frac{1}{50}$  e  $r = \frac{6}{7}$ , então o valor de  $\frac{2.p.r}{6.q}$  é igual a

- (A) 10
- (B)  $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D)  $\frac{1}{5}$
- (E) 5

13

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, \_\_\_).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

14

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que  $\frac{3}{4}$  da dosagem total é da solução H,  $\frac{1}{5}$  da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A)  $\frac{1}{4}$
- (B)  $\frac{15}{4}$
- (C)  $\frac{1}{15}$
- (D)  $\frac{4}{5}$
- (E)  $\frac{4}{15}$

15

Cinco pessoas, identificadas como P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>4</sub> e P<sub>5</sub>, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P<sub>3</sub> e P<sub>4</sub> irão fazer o mesmo tipo de exame, P<sub>2</sub> e P<sub>4</sub> irão fazer exames de tipos diferentes e P<sub>2</sub> e P<sub>5</sub> irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P<sub>1</sub> irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P<sub>5</sub> irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P<sub>3</sub> irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P<sub>2</sub> irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P<sub>4</sub> irá fazer o exame de Glicemia.

## Informática

16

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

17

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

18

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

19

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

20

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

## Conhecimentos Específicos

21

**Qual artéria tem seu suprimento sanguíneo advindo da artéria carótida interna?**

- (A) Artéria labial inferior.
- (B) Artéria maxilar interna.
- (C) Artéria temporal superficial.
- (D) Artéria supratroclear.
- (E) Artéria auricular posterior.

22

**Em relação ao fenômeno de retardo ou autonomização de retalhos, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Trata-se de um artifício cirúrgico que pode ser executado através da elevação parcial ou total de um retalho.
- (B) Seu efeito fisiológico é o aumento das artérias existentes ao longo do eixo de um retalho.
- (C) Tal procedimento deve ser executado em um único tempo cirúrgico.
- (D) Seu maior objetivo é fornecer um retalho mais seguro e longo.
- (E) É um procedimento permanente e irreversível.

23

**Em relação à classificação dos músculos com base no seu suprimento nervoso motor (Classificação de Taylor), assinale a alternativa correta.**

- (A) O tipo I tem como exemplo o músculo grande dorsal e é caracterizado por apresentar um nervo que se divide antes de entrar no músculo.
- (B) O tipo II tem como exemplo o músculo glúteo máximo e apresenta várias ramificações nervosas oriundas de um mesmo tronco nervoso.
- (C) O tipo III tem como exemplo o músculo trapézio e apresenta ramificações múltiplas oriundas de um mesmo tronco nervoso.
- (D) O tipo III tem como exemplo o músculo gastrocnêmio e apresenta um nervo único não ramificado antes de entrar no músculo.
- (E) O tipo IV tem como exemplo o músculo reto-abdominal e apresenta ramificações múltiplas oriundas de diferentes troncos nervosos.

24

**Quais são os retalhos musculares tipo II na classificação de Mathes e Nahai?**

- (A) Tensor da fáscia lata e gastrocnêmio.
- (B) Sóleo e grácil.
- (C) Glúteo Máximo e peitoral menor.
- (D) Sartório e tibial anterior.
- (E) Grande dorsal e peitoral maior.

25

**Em paciente submetido à zetaplastia com dois retalhos de comprimentos iguais e com ângulos de borda laterais de 75 graus, haverá um ganho teórico de comprimento da sua borda central de**

- (A) 25%.
- (B) 50%.
- (C) 75%.
- (D) 100%.
- (E) 125%.

26

**Considerando a microperfusão tecidual, qual das seguintes substâncias está relacionada à vasodilatação?**

- (A) Bradicininina.
- (B) Angiotensina II.
- (C) Endotelina I.
- (D) Espécies reativas de oxigênio.
- (E) Adrenalina.

27

**Qual substância está relacionada a reações de anabolismo na resposta endócrino metabólica ao trauma?**

- (A) Interleucina I.
- (B) Cortisol.
- (C) Glucagon.
- (D) Somatomedina C.
- (E) Fator de necrose tumoral.

28

**Qual condição NÃO está relacionada à perda de um retalho microcirúrgico?**

- (A) Temperatura corporal acima de 36°C.
- (B) Hipotensão.
- (C) Hipovolemia.
- (D) Compressão externa.
- (E) Resposta simpática à dor.

29

**Sobre o retalho antebraquial microcirúrgico, assinale a alternativa correta.**

- (A) Apresenta como pedículo vascular dominante a artéria ulnar.
- (B) Na síndrome de Mobius, o transplante microcirúrgico do retalho antebraquial é a opção de tratamento mais utilizada.
- (C) Em reconstruções penianas totais, seu uso é frequente, sendo realizada a anastomose do nervo antebraquial com o nervo ílio-inguinal.
- (D) Seu pedículo arterial e venoso se encontra na face extensora do antebraço.
- (E) Não é utilizado em reconstruções do pé devido à distância e às diferentes texturas de pele.

30

**Durante a expansão tecidual realizada por expansores, qual dos seguintes tecidos apresenta um maior aumento de espessura?**

- (A) Derme.
- (B) Tecido muscular.
- (C) Tecido ósseo.
- (D) Tecido celular subcutâneo.
- (E) Epiderme.

31

**Em relação aos expansores, assinale a alternativa correta.**

- (A) Válvulas devem ser alocadas em regiões corporais que não sofram pressões diretas conforme o paciente altere a sua posição.
- (B) Com o objetivo de diminuir a incidência de hematoma e seroma, deve-se iniciar a primeira expansão três semanas após a colocação do dispositivo.
- (C) O prazo limite para o uso de um expansor tecidual, independentemente da topografia, é de 3 meses.
- (D) Exposição precoce é melhor tratada através do uso de antibioticoterapia e curativos tipo compressivos.
- (E) Diferentes tolerâncias algicas não alteram o volume infundido.

32

**Um bom planejamento pré-operatório na colocação de expansores visa às seguintes situações, EXCETO**

- (A) incisões que se aloquem nas margens dos retalhos finais.
- (B) cápsula remanescente com presença de calcificações.
- (C) unidade estética reconstruída.
- (D) cicatrizes em posições minimamente aparentes.
- (E) linhas de tensão reduzidas.

**33**

**Sobre grandes queimados e sua fisiopatologia, assinale a alternativa correta.**

- (A) O choque instituído por queimadura é totalmente revertido por reposição volêmica.
- (B) Aumento na resistência vascular pulmonar e sistêmica, além de diminuição do débito cardíaco, são alterações decorrentes do choque.
- (C) Há um extravasamento capilar nas regiões danificadas pela lesão térmica, sendo tal processo poupado nas áreas corporais em que não houve lesão.
- (D) Laboratorialmente, na fase aguda, ocorre uma diminuição dos níveis de hematócrito.
- (E) Cortisol, insulina e ACTH encontram-se aumentados na fase aguda de uma queimadura.

**34**

**São características das queimaduras de terceiro grau, EXCETO**

- (A) ausência de cicatrização espontânea em lesões extensas.
- (B) presença de lesão marmórea e endurecida, sem perfusão capilar.
- (C) ausência de lesões bolhosas.
- (D) usualmente são extremamente dolorosas.
- (E) atingem camadas mais profundas do que a pele.

**35**

**Em relação à regra de Wallace (regra dos 9), assinale os dois segmentos corpóreos que apresentam diferentes porcentagens entre adultos e crianças.**

- (A) Membro superior e membro inferior.
- (B) Cabeça e membro superior.
- (C) Membro superior e tronco.
- (D) Cabeça e tronco.
- (E) Cabeça e membro inferior.

**36**

**Em caso de paciente vítima de queimadura que apresenta inalação de substâncias, são indicações de intubação orotraqueal devido a lesão por inalação, EXCETO**

- (A) estridor e taquipneia.
- (B) alteração na voz e rouquidão.
- (C) eritema e edema de orofaringe.
- (D) hipotensão e taquicardia.
- (E) partículas carbonáceas na face do paciente.

**37**

**Qual é o nome da região que circunda a queimadura e apresenta um tecido lesado, mas potencialmente recuperável caso não haja a persistência de insultos?**

- (A) Zona de Coagulação.
- (B) Zona de Hiperemia.
- (C) Zona de Estase.
- (D) Zona de Maturação.
- (E) Zona de Convergência.

**38**

**Qual substituto temporário de pele em queimados utiliza a pele de cadáver humanos?**

- (A) Aloenxerto.
- (B) Membrana Amniótica.
- (C) Xenoenxerto.
- (D) Duoderme.
- (E) Derme Alogênica.

**39**

**Em pacientes com presença de feridas crônicas provenientes de úlcera de pressão e osteomielite, que acabaram sofrendo degeneração maligna caracterizada pelo nome de úlcera de Marjolin, em qual tipo histológico é mais provável que tal tumor se desenvolva?**

- (A) Carcinoma espinocelular.
- (B) Carcinoma basocelular.
- (C) Melanoma maligno.
- (D) Sarcoma.
- (E) Teratoma.

**40**

**Em paciente com uma ferida aberta, qual é a célula que apresenta a função principal no fenômeno de contração?**

- (A) Miofibroblasto.
- (B) Condrócito.
- (C) Neutrófilo.
- (D) Plasmócito.
- (E) Macrófago.

**41**

**Em paciente com presença de sinostose da sutura sagital, aumento da distância anteroposterior e diminuição do diâmetro bi-temporal, o quadro corresponde a**

- (A) plagiocefalia.
- (B) escafocefalia.
- (C) trigonocefalia.
- (D) braquicefalia.
- (E) normocefalia.

**42**

**Paciente com craniossinostose caracterizada por apresentar sindactilia nas mãos e pés é característico de**

- (A) síndrome de Apert.
- (B) síndrome de Pfeiffer.
- (C) síndrome de Crouzon.
- (D) síndrome de Treacher Collins.
- (E) síndrome de Jackson-Weiss.

**43**

**Pacientes com a sequência de Pierre Robin apresentam qual tríade clínica clássica?**

- (A) Hipertelorismo, retrognatia, fissura palatina.
- (B) Glossoptose, hipertelorismo, comunicação interventricular.
- (C) Retrognatismo, obstrução das vias aéreas, glossoptose.
- (D) Fissura palatina, enoftalmia, glossoptose.
- (E) Enoftalmia, hipertelorismo, retrognatia.

**44**

**Sobre a palatoplastia de Furlow, assinale a alternativa correta.**

- (A) Apresenta uma liberação dos retalhos, de modo que estes se encontram bipediculados.
- (B) Os retalhos são liberados em sua porção anterior, com alongamento em V-Y do palato.
- (C) Apresenta a confecção de três retalhos de formatos piramidais, resultando em alongamento do palato em V-Y.
- (D) É a transposição de retalhos miomucosos do músculo salpingofaríngeo.
- (E) Tem como base cirúrgica uma dupla zetaplastia reversa e resulta no aumento do comprimento do palato.

**45**

**Paciente vítima de ferimento com arma branca, em face volar de mão, apresenta as seguintes características ao exame físico: parestesia de quinto dedo e de metade de quarto dedo, incapacidade de adução do polegar. Esse quadro clínico representa a lesão de qual nervo?**

- (A) Nervo mediano.
- (B) Nervo ulnar.
- (C) Nervo radial.
- (D) Nervo interósseo anterior.
- (E) Nervo interósseo posterior.

**46**

**É mais comumente associado ao desenvolvimento da doença de Dupuytren**

- (A) sexo feminino.
- (B) ser negro.
- (C) doença de Ledderhose.
- (D) início na primeira ou segunda década de vida.
- (E) priaprismo concomitante.

**47**

**Em caso de paciente vítima de trauma com perda de substancia no nível do joelho e exposição óssea e articular, qual é a melhor conduta?**

- (A) Retalho do músculo gastrocnêmio.
- (B) Retalho do músculo tensor da fáscia lata.
- (C) Retalho miocutâneo do músculo sóleo.
- (D) Retalho em cross-leg.
- (E) Enxerto de pele total.

**48**

**São fatores de risco para o retalho músculo-cutâneo abdominal na reconstrução de mama, EXCETO**

- (A) diabetes descompensada.
- (B) tabagismo.
- (C) incisão infraumbilical mediana prévia.
- (D) obesidade mórbida.
- (E) dermolipectomia abdominal prévia.

**49**

**Sobre grandes queimados, assinale a alternativa correta.**

- (A) As úlceras gastrointestinais do grande queimado são potencializadas pela isquemia da mucosa e podem ocorrer após 24h da queimadura.
- (B) Endoscopia de um paciente com mais de 40% de área corporal queimada pode revelar um grande número de lesões, denominadas úlceras de Cushing.
- (C) Desde o início, uma queimadura deve ser considerada como infectada, sendo prescrito antibiótico.
- (D) Uma lesão inalatória não ocorre sem queimadura de face.
- (E) A intoxicação por monóxido de carbono, com níveis de carboxi-hemoglobina até 30%, não apresenta ainda início de sintomatologia.

**50**

**Um paciente de 25 anos foi vítima de trauma grave, necessitando intubação e cuidados intensivos durante 21 dias. Evoluiu com úlcera sacral de 3x5 cm e, no momento, apresenta previsão de alta hospitalar, sem seqüela motora ou neurológica. Diante de tal quadro clínico, qual conduta é a menos apropriada para a cobertura da úlcera existente?**

- (A) Fechamento por segunda intenção.
- (B) Excisão e fechamento primário.
- (C) Retalho fáscio-cutâneo.
- (D) Retalho músculo-cutâneo do músculo glúteo máximo.
- (E) Retalho cutâneo.

**51**

**Sobre a classificação de BI-RADS, assinale a alternativa correta.**

- (A) BI-RADS 0 e 1 demonstram benignidade e não necessitam de avaliação ou exame complementar.
- (B) BI-RADS 2 condiz com achado provavelmente benigno, sendo necessário acompanhamento de 6/6 meses.
- (C) BI-RADS 3 recomenda biópsia de imediato.
- (D) O propósito da classificação de BI-RADS, na mamografia, no screening, é aumentar a indicação de biópsias clinicamente ocultas e a consequente detecção de tumores precoces.
- (E) BI-RADS 5 já apresenta biópsia comprovada de câncer de mama.

**52**

**Para paciente com quadro de osteomielite esternal pós-revascularização miocárdica, qual é a alternativa correta em relação à cobertura?**

- (A) Retalho do músculo grande dorsal baseado na artéria epigástrica superior.
- (B) Retalho músculo-cutâneo do reto-abdominal baseado na artéria circunflexa femoral lateral.
- (C) Retalho muscular do peitoral maior baseado na artéria tóraco-acromial.
- (D) Retalho serrátil anterior irrigado pela artéria torácica lateral.
- (E) Retalho do músculo platisma baseado na artéria escapular superior.

**53**

**Sobre o ligamento de Cooper, é correto afirmar que**

- (A) dá sustentação na ritidoplastia à plicatura do smas-platisma.
- (B) ajuda o músculo de Muller na elevação da pálpebra superior.
- (C) quando lesado, apresenta deformidade em pescoço de cisne.
- (D) abaixa a ponta do nariz ao sorrir.
- (E) é importante para o suporte das mamas.

**54**

**Em relação à reconstrução de mama utilizando o retalho do músculo grande dorsal, assinale a alternativa correta.**

- (A) Apresenta como contraindicação pacientes com toracotomia posteroanterior em que o músculo foi dividido.
- (B) Tem como pedículo dominante a artéria circunflexa da escápula.
- (C) A secção do nervo escapular não causa dificuldades técnicas em uma reconstrução futura.
- (D) Por se tratar de um músculo que se encontra na classificação número 3 de Mathes e Nahai, seu retalho é muito seguro.
- (E) Não é possível realizar uma reconstrução utilizando apenas tecido autólogo, sendo necessária a associação com implantes.

**55**

**Sobre o retalho TRAM microcirúrgico, assinale a alternativa correta.**

- (A) Tem maior eficiência vascular que o pediculado, pois é nutrido pela artéria epigástrica superior.
- (B) Tem maior modelagem na nova mama, pois pode ser reposicionado livremente na parede torácica.
- (C) Em uma reconstrução tardia, geralmente se utilizam como vaso receptor os vasos toracodorsais, pela maior facilidade da região axilar já dissecada em cirurgia prévia.
- (D) Tem maior agressão à parede abdominal devido ao maior tempo cirúrgico e manipulação local.
- (E) Em reconstruções bilaterais pós-mastectomias, o tempo cirúrgico não se torna fator limitante.

**56**

**Em relação à reconstrução de membro inferior, assinale a alternativa correta.**

- (A) O músculo solear é o maior músculo da perna e, por ter a irrigação tipo I (Nahai), é indicado para a cobertura do joelho.
- (B) O músculo grácil é irrigado pela artéria circunflexa femoral medial.
- (C) O gastrocnêmio apresenta dupla irrigação pela artéria sural medial e lateral, sendo considerado um tipo III (Nahai).
- (D) Retalhos musculares são contraindicados em tratamento de osteomielite de perna devido à boa efetividade através de retalhos fásquio-cutâneos.
- (E) A perna apresenta 3 compartimentos denominados anterior, posterior e medial.

**57**

**Sobre a reconstrução de defeitos vaginais congênitos e adquiridos, assinale a alternativa correta.**

- (A) A técnica de Mc Indoe corresponde a dois retalhos provenientes da região pudenda.
- (B) A técnica de Cingapura corresponde à dilatação seguida de um enxerto parcial de pele.
- (C) O retalho do músculo grácil é indicado para a reconstrução de defeitos vaginais circunferenciais, tendo uma maior taxa de perda comparado ao VRAM.
- (D) Jejuno e cólon sigmoide podem ser utilizados sem apresentar queixas futuras de secreção desagradável ou odor excessivo.
- (E) O retalho VRAM fica pediculado na artéria epigástrica superior.

**58**

**O Suprimento arterial da mama principal se dá através de ramos de três vasos que são:**

- (A) artéria epigástrica superior, artéria torácica lateral e artéria torácica interna.
- (B) artéria torácica superior, artéria torácica lateral e artérias intercostais.
- (C) artéria epigástrica superior, artérias intercostais e artéria torácica superior.
- (D) artéria torácica lateral, artéria mamária interna e artéria tóraco-acromial.
- (E) artéria torácica interna, artéria torácica lateral e artérias intercostais.

**59**

**Sobre enxertos de pele, assinale a alternativa correta.**

- (A) O fenômeno de contração primária é menor no enxerto de pele total, comparado ao enxerto de pele parcial.
- (B) Enxertos de pele total devem ser considerados em áreas funcionalmente ou esteticamente importantes (mãos e face, por exemplo).
- (C) O processo de revascularização se inicia na primeira hora após a enxertia.
- (D) A presença de hematoma entre a ferida e o enxerto não prejudica a sua integração.
- (E) A área doadora de enxertos de pele total é fechada por segunda intenção.

**60**

**Assinale a alternativa INCORRETA quanto a enxertos.**

- (A) Em enxertos de tendão, o tendão do músculo palmar longo é comumente utilizado.
- (B) O ílio é a área mais comumente utilizada para a coleta de enxertos ósseos.
- (C) Enxertos de ossos corticais são mais rapidamente integrados e revascularizados do que enxertos de ossos esponjosos.
- (D) O nervo sural é a fonte mais comum de enxerto autólogo de nervos.
- (E) Ao escolher nervos doadores para transferência, um grupo de músculos sinérgicos pode ser preferencial, no intuito de facilitar a re-educação pós-operatória.

Realização



**instituto aacp**



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T4433051N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA SAÚDE

## MÉDICO (CIRURGIA PLÁSTICA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

**SUPERIOR**

Turno

**TARDE**

**PROVA**

**04**

**Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!**



**instituto  
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar  
Concursos Públicos é Crime!  
Previsto no art. 311 - A do  
Código Penal

### Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

### Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

### Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

### Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

## Língua Portuguesa

### **Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas**

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>. Acesso em: 04 jan. 2021.

1

**Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.**

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**.”
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”.

2

**Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.**

**“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”**

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

3

**Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.**

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

4

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

5

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- ( ) Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- ( ) No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- ( ) O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- ( ) As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- ( ) O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

6

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

7

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referenciação nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

8

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

9

**Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.**

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

10

**Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.**

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

## Matemática

11

**Sendo  $p = \frac{7}{10}$ ,  $q = \frac{1}{50}$  e  $r = \frac{6}{7}$ , então o valor de  $\frac{2.p.r}{6.q}$  é igual a**

- (A) 10
- (B)  $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D)  $\frac{1}{5}$
- (E) 5

12

**Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:**

**(- 8, - 7, - 3, 4, 14, \_\_).**

**Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a**

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

13

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que  $\frac{3}{4}$  da dosagem total é da solução H,  $\frac{1}{5}$  da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

(A)  $\frac{1}{4}$

(B)  $\frac{15}{4}$

(C)  $\frac{1}{15}$

(D)  $\frac{4}{5}$

(E)  $\frac{4}{15}$

14

Cinco pessoas, identificadas como P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>4</sub> e P<sub>5</sub>, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P<sub>3</sub> e P<sub>4</sub> irão fazer o mesmo tipo de exame, P<sub>2</sub> e P<sub>4</sub> irão fazer exames de tipos diferentes e P<sub>2</sub> e P<sub>5</sub> irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P<sub>1</sub> irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P<sub>5</sub> irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P<sub>3</sub> irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P<sub>2</sub> irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P<sub>4</sub> irá fazer o exame de Glicemia.

15

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

## Informática

16

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

17

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

18

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

19

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

20

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

## Conhecimentos Específicos

21

**Em relação ao fenômeno de retardo ou autonomização de retalhos, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Trata-se de um artifício cirúrgico que pode ser executado através da elevação parcial ou total de um retalho.
- (B) Seu efeito fisiológico é o aumento das artérias existentes ao longo do eixo de um retalho.
- (C) Tal procedimento deve ser executado em um único tempo cirúrgico.
- (D) Seu maior objetivo é fornecer um retalho mais seguro e longo.
- (E) É um procedimento permanente e irreversível.

22

**Em relação à classificação dos músculos com base no seu suprimento nervoso motor (Classificação de Taylor), assinale a alternativa correta.**

- (A) O tipo I tem como exemplo o músculo grande dorsal e é caracterizado por apresentar um nervo que se divide antes de entrar no músculo.
- (B) O tipo II tem como exemplo o músculo glúteo máximo e apresenta várias ramificações nervosas oriundas de um mesmo tronco nervoso.
- (C) O tipo III tem como exemplo o músculo trapézio e apresenta ramificações múltiplas oriundas de um mesmo tronco nervoso.
- (D) O tipo III tem como exemplo o músculo gastrocnêmio e apresenta um nervo único não ramificado antes de entrar no músculo.
- (E) O tipo IV tem como exemplo o músculo reto-abdominal e apresenta ramificações múltiplas oriundas de diferentes troncos nervosos.

23

**Quais são os retalhos musculares tipo II na classificação de Mathes e Nahai?**

- (A) Tensor da fáscia lata e gastrocnêmio.
- (B) Sóleo e grácil.
- (C) Glúteo Máximo e peitoral menor.
- (D) Sartório e tibial anterior.
- (E) Grande dorsal e peitoral maior.

24

**Em paciente submetido à zetaplastia com dois retalhos de comprimentos iguais e com ângulos de borda laterais de 75 graus, haverá um ganho teórico de comprimento da sua borda central de**

- (A) 25%.
- (B) 50%.
- (C) 75%.
- (D) 100%.
- (E) 125%.

25

**Considerando a microperfusão tecidual, qual das seguintes substâncias está relacionada à vasodilatação?**

- (A) Bradicinina.
- (B) Angiotensina II.
- (C) Endotelina I.
- (D) Espécies reativas de oxigênio.
- (E) Adrenalina.

26

**Qual substância está relacionada a reações de anabolismo na resposta endócrino metabólica ao trauma?**

- (A) Interleucina I.
- (B) Cortisol.
- (C) Glucagon.
- (D) Somatomedina C.
- (E) Fator de necrose tumoral.

**27**

**Qual condição NÃO está relacionada à perda de um retalho microcirúrgico?**

- (A) Temperatura corporal acima de 36°C.
- (B) Hipotensão.
- (C) Hipovolemia.
- (D) Compressão externa.
- (E) Resposta simpática à dor.

**28**

**Sobre o retalho antebraquial microcirúrgico, assinale a alternativa correta.**

- (A) Apresenta como pedículo vascular dominante a artéria ulnar.
- (B) Na síndrome de Mobius, o transplante microcirúrgico do retalho antebraquial é a opção de tratamento mais utilizada.
- (C) Em reconstruções penianas totais, seu uso é frequente, sendo realizada a anastomose do nervo antebraquial com o nervo ílio-inguinal.
- (D) Seu pedículo arterial e venoso se encontra na face extensora do antebraço.
- (E) Não é utilizado em reconstruções do pé devido à distância e às diferentes texturas de pele.

**29**

**Durante a expansão tecidual realizada por expansores, qual dos seguintes tecidos apresenta um maior aumento de espessura?**

- (A) Derme.
- (B) Tecido muscular.
- (C) Tecido ósseo.
- (D) Tecido celular subcutâneo.
- (E) Epiderme.

**30**

**Em relação aos expansores, assinale a alternativa correta.**

- (A) Válvulas devem ser alocadas em regiões corporais que não sofram pressões diretas conforme o paciente altere a sua posição.
- (B) Com o objetivo de diminuir a incidência de hematoma e seroma, deve-se iniciar a primeira expansão três semanas após a colocação do dispositivo.
- (C) O prazo limite para o uso de um expansor tecidual, independentemente da topografia, é de 3 meses.
- (D) Exposição precoce é melhor tratada através do uso de antibioticoterapia e curativos tipo compressivos.
- (E) Diferentes tolerâncias algicas não alteram o volume infundido.

**31**

**Um bom planejamento pré-operatório na colocação de expansores visa às seguintes situações, EXCETO**

- (A) incisões que se aloquem nas margens dos retalhos finais.
- (B) cápsula remanescente com presença de calcificações.
- (C) unidade estética reconstruída.
- (D) cicatrizes em posições minimamente aparentes.
- (E) linhas de tensão reduzidas.

**32**

**Sobre grandes queimados e sua fisiopatologia, assinale a alternativa correta.**

- (A) O choque instituído por queimadura é totalmente revertido por reposição volêmica.
- (B) Aumento na resistência vascular pulmonar e sistêmica, além de diminuição do débito cardíaco, são alterações decorrentes do choque.
- (C) Há um extravasamento capilar nas regiões danificadas pela lesão térmica, sendo tal processo poupado nas áreas corporais em que não houve lesão.
- (D) Laboratorialmente, na fase aguda, ocorre uma diminuição dos níveis de hematócrito.
- (E) Cortisol, insulina e ACTH encontram-se aumentados na fase aguda de uma queimadura.

**33**

**São características das queimaduras de terceiro grau, EXCETO**

- (A) ausência de cicatrização espontânea em lesões extensas.
- (B) presença de lesão marmórea e endurecida, sem perfusão capilar.
- (C) ausência de lesões bolhosas.
- (D) usualmente são extremamente dolorosas.
- (E) atingem camadas mais profundas do que a pele.

**34**

**Em relação à regra de Wallace (regra dos 9), assinale os dois segmentos corpóreos que apresentam diferentes porcentagens entre adultos e crianças.**

- (A) Membro superior e membro inferior.
- (B) Cabeça e membro superior.
- (C) Membro superior e tronco.
- (D) Cabeça e tronco.
- (E) Cabeça e membro inferior.

**35**

**Em caso de paciente vítima de queimadura que apresenta inalação de substâncias, são indicações de intubação orotraqueal devido a lesão por inalação, EXCETO**

- (A) estridor e taquipneia.
- (B) alteração na voz e rouquidão.
- (C) eritema e edema de orofaringe.
- (D) hipotensão e taquicardia.
- (E) partículas carbonáceas na face do paciente.

**36**

**Qual é o nome da região que circunda a queimadura e apresenta um tecido lesado, mas potencialmente recuperável caso não haja a persistência de insultos?**

- (A) Zona de Coagulação.
- (B) Zona de Hiperemia.
- (C) Zona de Estase.
- (D) Zona de Maturação.
- (E) Zona de Convergência.

**37**

**Qual substituto temporário de pele em queimados utiliza a pele de cadáver humanos?**

- (A) Aloenxerto.
- (B) Membrana Amniótica.
- (C) Xenoenxerto.
- (D) Duoderme.
- (E) Derme Alogênica.

**38**

**Em pacientes com presença de feridas crônicas provenientes de úlcera de pressão e osteomielite, que acabaram sofrendo degeneração maligna caracterizada pelo nome de úlcera de Marjolin, em qual tipo histológico é mais provável que tal tumor se desenvolva?**

- (A) Carcinoma espinocelular.
- (B) Carcinoma basocelular.
- (C) Melanoma maligno.
- (D) Sarcoma.
- (E) Teratoma.

**39**

**Em paciente com uma ferida aberta, qual é a célula que apresenta a função principal no fenômeno de contração?**

- (A) Miofibroblasto.
- (B) Condrócito.
- (C) Neutrófilo.
- (D) Plasmócito.
- (E) Macrófago.

**40**

**Em paciente com presença de sinostose da sutura sagital, aumento da distância anteroposterior e diminuição do diâmetro bi-temporal, o quadro corresponde a**

- (A) plagiocefalia.
- (B) escafocefalia.
- (C) trigonocefalia.
- (D) braquicefalia.
- (E) normocefalia.

41

**Paciente com craniossinostose caracterizada por apresentar sindactilia nas mãos e pés é característico de**

- (A) síndrome de Apert.
- (B) síndrome de Pfeiffer.
- (C) síndrome de Crouzon.
- (D) síndrome de Treacher Collins.
- (E) síndrome de Jackson-Weiss.

42

**Pacientes com a sequência de Pierre Robin apresentam qual tríade clínica clássica?**

- (A) Hipertelorismo, retrognatia, fissura palatina.
- (B) Glossoptose, hipertelorismo, comunicação interventricular.
- (C) Retrognatismo, obstrução das vias aéreas, glossoptose.
- (D) Fissura palatina, enoftalmia, glossoptose.
- (E) Enoftalmia, hipertelorismo, retrognatia.

43

**Sobre a palatoplastia de Furlow, assinale a alternativa correta.**

- (A) Apresenta uma liberação dos retalhos, de modo que estes se encontram bipediculados.
- (B) Os retalhos são liberados em sua porção anterior, com alongamento em V-Y do palato.
- (C) Apresenta a confecção de três retalhos de formatos piramidais, resultando em alongamento do palato em V-Y.
- (D) É a transposição de retalhos miomucosos do músculo salpingofaríngeo.
- (E) Tem como base cirúrgica uma dupla zetaplastia reversa e resulta no aumento do comprimento do palato.

44

**Paciente vítima de ferimento com arma branca, em face volar de mão, apresenta as seguintes características ao exame físico: parestesia de quinto dedo e de metade de quarto dedo, incapacidade de adução do polegar. Esse quadro clínico representa a lesão de qual nervo?**

- (A) Nervo mediano.
- (B) Nervo ulnar.
- (C) Nervo radial.
- (D) Nervo interósseo anterior.
- (E) Nervo interósseo posterior.

45

**É mais comumente associado ao desenvolvimento da doença de Dupuytren**

- (A) sexo feminino.
- (B) ser negro.
- (C) doença de Ledderhose.
- (D) início na primeira ou segunda década de vida.
- (E) priaprismo concomitante.

46

**Em caso de paciente vítima de trauma com perda de substância no nível do joelho e exposição óssea e articular, qual é a melhor conduta?**

- (A) Retalho do músculo gastrocnêmio.
- (B) Retalho do músculo tensor da fáscia lata.
- (C) Retalho miocutâneo do músculo sóleo.
- (D) Retalho em cross-leg.
- (E) Enxerto de pele total.

47

**São fatores de risco para o retalho músculo-cutâneo abdominal na reconstrução de mama, EXCETO**

- (A) diabetes descompensada.
- (B) tabagismo.
- (C) incisão infraumbilical mediana prévia.
- (D) obesidade mórbida.
- (E) dermolipectomia abdominal prévia.

**48**

**Sobre grandes queimados, assinale a alternativa correta.**

- (A) As úlceras gastrointestinais do grande queimado são potencializadas pela isquemia da mucosa e podem ocorrer após 24h da queimadura.
- (B) Endoscopia de um paciente com mais de 40% de área corporal queimada pode revelar um grande número de lesões, denominadas úlceras de Cushing.
- (C) Desde o início, uma queimadura deve ser considerada como infectada, sendo prescrito antibiótico.
- (D) Uma lesão inalatória não ocorre sem queimadura de face.
- (E) A intoxicação por monóxido de carbono, com níveis de carboxi-hemoglobina até 30%, não apresenta ainda início de sintomatologia.

**49**

**Um paciente de 25 anos foi vítima de trauma grave, necessitando intubação e cuidados intensivos durante 21 dias. Evoluiu com úlcera sacral de 3x5 cm e, no momento, apresenta previsão de alta hospitalar, sem sequela motora ou neurológica. Diante de tal quadro clínico, qual conduta é a menos apropriada para a cobertura da úlcera existente?**

- (A) Fechamento por segunda intenção.
- (B) Excisão e fechamento primário.
- (C) Retalho fáscio-cutâneo.
- (D) Retalho músculo-cutâneo do músculo glúteo máximo.
- (E) Retalho cutâneo.

**50**

**Sobre a classificação de BI-RADS, assinale a alternativa correta.**

- (A) BI-RADS 0 e 1 demonstram benignidade e não necessitam de avaliação ou exame complementar.
- (B) BI-RADS 2 condiz com achado provavelmente benigno, sendo necessário acompanhamento de 6/6 meses.
- (C) BI-RADS 3 recomenda biópsia de imediato.
- (D) O propósito da classificação de BI-RADS, na mamografia, no screening, é aumentar a indicação de biópsias clinicamente ocultas e a consequente detecção de tumores precoces.
- (E) BI-RADS 5 já apresenta biópsia comprovada de câncer de mama.

**51**

**Para paciente com quadro de osteomielite esternal pós-revascularização miocárdica, qual é a alternativa correta em relação à cobertura?**

- (A) Retalho do músculo grande dorsal baseado na artéria epigástrica superior.
- (B) Retalho músculo-cutâneo do reto-abdominal baseado na artéria circunflexa femoral lateral.
- (C) Retalho muscular do peitoral maior baseado na artéria tóraco-acromial.
- (D) Retalho serrátil anterior irrigado pela artéria torácica lateral.
- (E) Retalho do músculo platíma baseado na artéria escapular superior.

**52**

**Sobre o ligamento de Cooper, é correto afirmar que**

- (A) dá sustentação na ritidoplastia à plicatura do smas-platíma.
- (B) ajuda o músculo de Muller na elevação da pálpebra superior.
- (C) quando lesado, apresenta deformidade em pescoço de cisne.
- (D) abaixa a ponta do nariz ao sorrir.
- (E) é importante para o suporte das mamas.

**53**

**Em relação à reconstrução de mama utilizando o retalho do músculo grande dorsal, assinale a alternativa correta.**

- (A) Apresenta como contraindicação pacientes com toracotomia posteroanterior em que o músculo foi dividido.
- (B) Tem como pedículo dominante a artéria circunflexa da escápula.
- (C) A secção do nervo escapular não causa dificuldades técnicas em uma reconstrução futura.
- (D) Por se tratar de um músculo que se encontra na classificação número 3 de Mathes e Nahai, seu retalho é muito seguro.
- (E) Não é possível realizar uma reconstrução utilizando apenas tecido autólogo, sendo necessária a associação com implantes.

**54**

**Sobre o retalho TRAM microcirúrgico, assinale a alternativa correta.**

- (A) Tem maior eficiência vascular que o pediculado, pois é nutrido pela artéria epigástrica superior.
- (B) Tem maior modelagem na nova mama, pois pode ser reposicionado livremente na parede torácica.
- (C) Em uma reconstrução tardia, geralmente se utilizam como vaso receptor os vasos toracodorsais, pela maior facilidade da região axilar já dissecada em cirurgia prévia.
- (D) Tem maior agressão à parede abdominal devido ao maior tempo cirúrgico e manipulação local.
- (E) Em reconstruções bilaterais pós-mastectomias, o tempo cirúrgico não se torna fator limitante.

**55**

**Em relação à reconstrução de membro inferior, assinale a alternativa correta.**

- (A) O músculo solear é o maior músculo da perna e, por ter a irrigação tipo I (Nahai), é indicado para a cobertura do joelho.
- (B) O músculo grácil é irrigado pela artéria circunflexa femoral medial.
- (C) O gastrocnêmio apresenta dupla irrigação pela artéria sural medial e lateral, sendo considerado um tipo III (Nahai).
- (D) Retalhos musculares são contraindicados em tratamento de osteomielite de perna devido à boa efetividade através de retalhos fásquio-cutâneos.
- (E) A perna apresenta 3 compartimentos denominados anterior, posterior e medial.

**56**

**Sobre a reconstrução de defeitos vaginais congênitos e adquiridos, assinale a alternativa correta.**

- (A) A técnica de Mc Indoe corresponde a dois retalhos provenientes da região pudenda.
- (B) A técnica de Cingapura corresponde à dilatação seguida de um enxerto parcial de pele.
- (C) O retalho do músculo grácil é indicado para a reconstrução de defeitos vaginais circunferenciais, tendo uma maior taxa de perda comparado ao VRAM.
- (D) Jejunos e cólon sigmoide podem ser utilizados sem apresentar queixas futuras de secreção desagradável ou odor excessivo.
- (E) O retalho VRAM fica pediculado na artéria epigástrica superior.

**57**

**O Suprimento arterial da mama principal se dá através de ramos de três vasos que são:**

- (A) artéria epigástrica superior, artéria torácica lateral e artéria torácica interna.
- (B) artéria torácica superior, artéria torácica lateral e artérias intercostais.
- (C) artéria epigástrica superior, artérias intercostais e artéria torácica superior.
- (D) artéria torácica lateral, artéria mamária interna e artéria tóraco-acromial.
- (E) artéria torácica interna, artéria torácica lateral e artérias intercostais.

**58****Sobre enxertos de pele, assinale a alternativa correta.**

- (A) O fenômeno de contração primária é menor no enxerto de pele total, comparado ao enxerto de pele parcial.
- (B) Enxertos de pele total devem ser considerados em áreas funcionalmente ou esteticamente importantes (mãos e face, por exemplo).
- (C) O processo de revascularização se inicia na primeira hora após a enxertia.
- (D) A presença de hematoma entre a ferida e o enxerto não prejudica a sua integração.
- (E) A área doadora de enxertos de pele total é fechada por segunda intenção.

**59****Assinale a alternativa INCORRETA quanto a enxertos.**

- (A) Em enxertos de tendão, o tendão do músculo palmar longo é comumente utilizado.
- (B) O ílio é a área mais comumente utilizada para a coleta de enxertos ósseos.
- (C) Enxertos de ossos corticais são mais rapidamente integrados e revascularizados do que enxertos de ossos esponjosos.
- (D) O nervo sural é a fonte mais comum de enxerto autólogo de nervos.
- (E) Ao escolher nervos doadores para transferência, um grupo de músculos sinérgicos pode ser preferencial, no intuito de facilitar a re-educação pós-operatória.

**60****Qual artéria tem seu suprimento sanguíneo advindo da artéria carótida interna?**

- (A) Artéria labial inferior.
- (B) Artéria maxilar interna.
- (C) Artéria temporal superficial.
- (D) Artéria supratroclear.
- (E) Artéria auricular posterior.

Realização



**instituto aocp**