

## **CARGO: ODONTÓLOGO**

### **INSTRUÇÕES AO CANDIDATO**

**Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020.**

**É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova.**

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:**
  - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
  - b) Comunicação entre candidatos;**
  - c) Uso de máquina calculadora;
  - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
  - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
  - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
  - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;
  
- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
  
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
  
- O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo:

1	■	B	C	D	E
2	A	B	■	D	E
  
- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente, com tinta azul ou preta;
  
- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
  
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;
  
- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;

- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	03 (três)
Matemática e Raciocínio Lógico Matemático	02 (dois)
Conhecimentos Específicos	10 (dez)
<b>Total de Questões</b>	<b>15 (quinze)</b>

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

## CADERNO DE PROVA

### LÍNGUA PORTUGUESA

**01** – Assinale a alternativa em que o verbo destacado exerce transitividade direta:

- a) Novato na arte e muito sensível, pequenas coisas o enamoram.
- b) Roberto descontrolou-se ao receber a má notícia.
- c) Cadastrei-me para receber as ofertas.
- d) No início do inverno, o Ministério da Saúde sempre aconselha vacinar os idosos contra a gripe.
- e) Já velho, resolveu arrumar com a loja.

**02** – Com base nas figuras de linguagem, analise:

*“Deus criou o sol e a lua e as estrelas. E fez o homem e deu-lhe inteligência e fê-lo chefe da natureza.”*

Assinale a alternativa correta:

- a) Anástrofe.
- b) Pleonasma enfático.
- c) Polissíndeto.
- d) Zeugma.
- e) Hipérbato.

**03** – Acerca do emprego do pronome relativo, analise:

*“Nas orações relativas coordenadas, se a função do pronome relativo é a mesma, é frequente elipsar-se o relativo da segunda oração, principalmente quando a primeira é curta. No entanto, se o pronome relativo não desempenhar a mesma função sintática, deve-se repeti-lo obrigatoriamente.”*

(Fonte adaptada: BEZERRA, R. – Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos>)

Assim sendo, assinale a alternativa em que, por não desempenhar a mesma função sintática, o pronome relativo foi incorretamente ocultado da segunda oração:

- a) “Encontrando-se Juliano Apóstata com S. Pigménio, presbítero romano, que era cego e depois padeceu martírio, como quem o saudava benevolmente, disse...”. (M. Bernardes apud Mário Barreto).
- b) “Ao lado do meu leito estava um padre: era o velho abade que me batizara e me ensinara a ler.” (A. Herculano).
- c) Ontem conversei com o homem que me salvou e me levou ao hospital quando ocorreu o acidente.

**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC**

- d) “O que ele via era a mulher que o fascinara e perdera.” (Camilo Castelo Branco).
- e) “A monarquia visigótica procurou imitar do império que morrera e ela substituíra.” (A. Herculano).

**MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO**

**04** – Aos finais de semana, as estações A e B operam com intervalos entre os trens de 12 minutos e de 25 minutos, respectivamente. Sabendo que às 5h00 partiram simultaneamente um trem da estação A e um trem da estação B, é correto afirmar que partirão novamente, no mesmo horário, um trem da estação A e um trem da estação B, às:

- a) 7h45.  
b) 9h25.  
c) 10h00.  
d) 14h10.  
e) 15h00.

**05** – Um investimento de valor inicial igual a R\$ 8.400,00 foi realizado a juros simples de 5% ao ano. O rendimento após 3 anos é igual a:

- a) R\$ 1.042,00.  
b) R\$ 1.145,00.  
c) R\$ 1.260,00.  
d) R\$ 2.387,00.  
e) R\$ 2.420,00.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**ODONTÓLOGO**

**06** – Em odontologia preventiva, o Ministério da Saúde aponta que as anormalidades dentofaciais são avaliadas, nas idades de 12 e 15 a 19 anos, com base em informações relativas a 3 grupos de condições: dentição, espaço e oclusão. Tais condições compõem o:

- a) Índice de Má-Oclusão.  
b) Índice de Estética Dental.  
c) Índice de Desalinhamento.  
d) Índice de Fluorose Dental.  
e) Índice de Higiene Dentária.

**07** – Leia:

*“A situação quanto às próteses dentárias será avaliada a partir de informações sobre seu uso e necessidade, os quais têm como base a presença de espaços protéticos. Um mesmo indivíduo pode estar usando e, ao mesmo tempo, necessitar prótese(s). Deve ser assinalado o uso e a necessidade para os arcos superior e inferior.”*

(Fonte adaptada: [http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/condSB\\_man\\_exam.pdf](http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/condSB_man_exam.pdf)).

Com base nas informações dadas pelo Ministério da Saúde, para um paciente com espaços protéticos, em vários pontos da boca, o critério de indicação é:

- a) Necessita prótese dentária total.
- b) Não necessita de prótese dentária.
- c) Necessita uma prótese, fixa ou removível, para substituição de um elemento.
- d) Necessita uma prótese, fixa ou removível, para substituição de mais de um elemento.
- e) Necessita uma combinação de próteses, fixas e/ou removíveis, para substituição de um e/ou mais de um elemento.

**08** – A duração da anestesia pulpar (tecidos duros) e dos tecidos moles (total), citada para cada substância é apresentada de maneira aproximada. Muitos fatores afetam a profundidade e a duração da ação anestésica da substância, prolongando-a ou (muito mais comumente) reduzindo-a. Dos fatores que afetam a profundidade e duração da anestesia, em odontologia, não se inclui:

- a) Variação anatômica.
- b) Precisão no depósito do anestésico local.
- c) Presença de osso alveolar de espessura normal.
- d) Resposta individual à substância (a curva “em forma de sino”).
- e) Condição dos tecidos no local da infiltração da substância (vascularização, pH).

**09** – É contraindicação absoluta de uso para qualquer anestésico local, sem vasoconstritor:

- a) Alergia ao bissulfito.
- b) Metemoglobinemia.
- c) Disfunção renal significativa.
- d) Hipertireoidismo clínico.
- e) Colinesterase plasmática atípica.

**10** – Analise as técnicas anestésicas, abaixo:

*I- Anestesia locoterminal;*

*II- Anestesia locorregional;*

*III- Bloqueio de um tronco nervoso principal;*

*IV- Anestesia circunscrita.*

Conforme as descrições, é correto afirmar que:

- a) I e II são classificadas como técnicas de Bloqueio de Campo; III e IV são classificadas como técnicas de Bloqueio de Nervo.
- b) III e IV são classificadas como técnicas de Bloqueio de Campo; I e II são classificadas como técnicas de Bloqueio de Nervo.
- c) I e IV são classificadas como técnicas de Bloqueio de Campo; II e III são classificadas como técnicas de Bloqueio de Nervo.
- d) II e III são classificadas como técnicas de Bloqueio de Campo; I e IV são classificadas como técnicas de Bloqueio de Nervo.
- e) I e III são classificadas como técnicas de Bloqueio de Campo; II e IV são classificadas como técnicas de Bloqueio de Nervo.

**11** – A Cefalotina, Cefalosporina de primeira geração, tem como principais usos:

- a) Infecções graves por bactérias sensíveis gram-negativas como sepse, pneumonias, pielonefrite, infecções de pele, ossos, articulações e infecções ginecológicas.
- b) Pneumonia pneumocócica (somente cepas plenamente sensíveis), sífilis, faringite e celulite estreptocócica.
- c) Erisipela, pneumonia, sífilis, meningite, endocardite bacteriana, sepse e infecções da pele e tecidos moles.
- d) Pneumonias, infecções urinárias, infecções de pele e de tecidos moles, infecções das vias aéreas superiores e profilaxia cirúrgica.
- e) Infecções de pele e tecidos moles, artrite séptica, osteomielite, celulite periorbitária e infecções de vias aéreas.

**12** – De acordo com Nota Técnica 01/2016, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é uma estratégia inovadora para a Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família que deve provocar a mudança, na atuação dos profissionais e ampliar a abrangência e o escopo das ações e sua resolutividade. Seu objetivo principal é:

- a) Considerar riscos e vulnerabilidade do usuário.
- b) O acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizada como porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção.
- c) Acolher os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização de atenção às suas necessidades de saúde.

**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC**

- d) Sinalizar quais os serviços ofertados nos municípios e na rede regional, dispondo o caminho que os usuários devem seguir para atendimento, apontando as responsabilidades de cada ator em seu espaço de atuação.
- e) Apoiar e ampliar as ações das equipes da Estratégia Saúde da Família na qualificação do cuidado em saúde, a partir do processo de territorialização e regionalização, pautado na implantação das Redes e Linhas de Cuidado.

**13 – Observe a imagem, abaixo:**



Mordidas de cachorro, na região da cabeça e do pescoço, são motivos mais comuns para atendimentos de emergência, e os pacientes podem ter lesões significativas ao tecido mole e também fraturas do osso subjacente e estruturas dentoalveolares. Sobre as medidas de tratamento nesses casos, considere os itens abaixo:

*I- Cobertura antibiótica adequada e controle do tétano são importantes com mordidas de animais. As feridas devem ser cuidadosamente debridadas e irrigadas. A maioria das lacerações e feridas em retalho pode ser fechada primariamente, mas feridas do tipo perfuradas e feridas com excesso de esmagamento do tecido que requerem considerável debridamento devem ser adiadas por vários dias antes do tratamento definitivo;*

*II- Feridas que tiveram lesão por esmagamento significativo ou cicatrização por segunda intenção podem desenvolver cicatrizes significativas. 3 meses após a lesão, o tecido cicatricial imaturo é irregular, em relevo e arroxeadado por causa do aumento da vascularização, colágeno e fibroblastos;*

*III- Se uma cicatriz cruzar as linhas favoráveis das linhas de tensão que seguem a contração subjacente do músculo na face, a tensão sobre as margens da ferida na pele tenderá a puxar as*

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC

*bordas da ferida separadamente. A técnica operatória pobre é, geralmente, a causa de cicatrizes hipertróficas. O fechamento irregular do ferimento, a falha no fechamento da ferida em camadas e o alívio da tensão, nas margens da ferida, além de impróprio debridamento e preparação da ferida antes do fechamento, resultam em excesso de formação de cicatriz.*

Dos itens acima:

- a) Apenas o item I está correto.
- b) Apenas os itens I e II estão corretos.
- c) Apenas os itens I e III estão corretos.
- d) Apenas os itens II e III estão corretos.
- e) Todos os itens estão corretos.

**14** – Leia o trecho a seguir:

*Das lesões fundamentais da cavidade oral, \_\_\_\_\_ é definida como perda parcial do tecido epitelial sem atingir o tecido conjuntivo adjacente.*

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto:

- a) Erosão.
- b) Vesícula.
- c) Úlcera.
- d) Fibroma.
- e) Placa.

**15** – Considere a alternativa que indique, corretamente, o segmento e conduta corretos em casos de Fratura da Parede e Processo Alveolar:

- a) O elemento fraturado deve ser armazenado em soro fisiológico para colagem (técnica de baixo custo e de resultados estéticos satisfatórios). Também pode ser feita a restauração convencional.
- b) Caso a fratura seja no sentido horizontal, pode-se manter o elemento radicular por meio de técnicas de reposicionamento dental. É necessário o tratamento endodôntico pelo risco de necrose pulpar. O rápido atendimento após o trauma oferece melhor prognóstico. Na fratura vertical, o único tratamento é a extração do elemento dentário.
- c) Reposicionamento dental e contenção rígida. Pode ser necessária a realização do tratamento endodôntico em alguns casos.
- d) Reposicionamento do elemento dental e necessidade de contenção semirrígida por quatro semanas. Pode ser necessária a realização de tratamento endodôntico.

**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC**

- e) Reposicionamento do fragmento e contenção rígida ou semirrígida por quatro semanas.  
Necessidade de acompanhamento odontológico depois de quatro, oito, 24 semanas a um ano.