

DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2023**

MÉDICO (PATOLOGIA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_08/05/2023 18:30:09



POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – De acordo com o disposto na Portaria nº 2.436/2017, a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos _____, de forma a _____ ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) equivalentes – associar a
- B) distintos – distinguir de
- C) discordantes – discernir entre
- D) contraditórios – distinguir e discernir entre
- E) incompatíveis – associar e ligar a

QUESTÃO 02 – Em relação à Atenção Básica, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas.
- () Ações de saúde que envolvem cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- () As equipes assumem responsabilidade sanitária sobre território definido.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 03 – De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

- I. Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.
- II. Garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica.
- III. Inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.
- IV. Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica.

Qual estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa INCORRETA considerando o Estatuto da Pessoa Idosa (2003) e suas alterações.

- A) É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.
- B) Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social.
- C) Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas, gratuitamente, próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- D) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- E) É assegurado o direito a acompanhante à pessoa idosa internada ou em observação, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

QUESTÃO 05 – Segundo o Estatuto do Idoso, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticados contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a qualquer dos seguintes órgãos:

- I. Conselho Municipal da Pessoa Idosa.
- II. Conselho Interfederativo da Pessoa Idosa.
- III. Conselho Estadual da Pessoa Idosa.
- IV. Defensoria Pública da Pessoa Idosa.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – A respeito de indicadores de saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. Um indicador é uma variável, característica ou atributo de Estrutura, Processo ou Resultado, baseada em Donabedian (1980, 1990), que é capaz de sintetizar e/ou representar e/ou dar maior significado ao que se quer avaliar.
- II. O componente Estrutura inclui a relação entre categorias de recursos humanos existentes, tal como o número de agentes comunitários de saúde ou de profissionais de enfermagem.
- III. O componente Processo inclui a relação entre as atividades de distintos profissionais, tal como número de atividades sobre saúde reprodutiva realizadas para adolescentes no serviço de saúde ou número de primeira consulta ginecológica para gestantes.
- IV. Entre os componentes adotados na construção de um indicador, pode-se avaliar as relações que permitem a análise de quanto cada componente influencia o outro, tal como a relação estrutura/processo, avaliando a relação entre recursos existentes e a produtividade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 07 – A respeito da utilização da epidemiologia em saúde, considerando os termos comuns usados na interpretação da literatura médica para exames diagnósticos, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A probabilidade pós-teste é igual a chances pós-teste / (1 + chances pós-teste).
- () Através de um nomograma, pode-se calcular a probabilidade pós-teste usando a probabilidade pré-teste e a razão de verossimilhança, sem ter que converter a probabilidade pré-teste em chances.
- () A razão de verossimilhança negativa é a razão entre a probabilidade de um resultado negativo de exame entre pacientes sem a doença e a probabilidade de um resultado positivo entre pacientes com a doença.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 08 – No campo da ética médica ou bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No estabelecimento de prioridades nas políticas públicas de saúde, os gestores têm utilizado balizamentos, entre eles, as bases epidemiológicas e demográficas, a vulnerabilidade do agravo, os recursos, a tecnologia disponível e a efetividade dos procedimentos.
- B) Como Norma Diceológica, é direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- C) Como Norma Diceológica, é direito do médico realizar a procriação medicamente assistida, desde que seja com o objetivo de criar embriões com a finalidade de escolha de sexo.
- D) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- E) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente.

QUESTÃO 09 – Em relação à doença de Chagas, pode-se afirmar que:

- I. A disfunção do trato gastrointestinal é a manifestação mais frequente da doença de Chagas crônica no ser humano.
- II. Histologicamente, na doença de Chagas acometendo o trato gastrointestinal, evidencia-se um infiltrado inflamatório com predomínio de linfócitos acometendo o plexo mioentérico, podendo haver a perda de até 95% das células ganglionares / neurônios.
- III. O diagnóstico diferencial da doença de Chagas acometendo o trato gastrointestinal inclui a acalásia primária idiopática e neuropatias viscerais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que cita o parasita que NÃO corresponde a um nematódeo.

- A) *Enterobius vermicularis*.
- B) *Ascaris lumbricoides*.
- C) *Ancylostoma duodenale*.
- D) *Schistosoma mansoni*.
- E) *Trichuris trichiura*.

QUESTÃO 11 – Em relação ao envolvimento do trato gastrointestinal de pacientes portadores de deficiência seletiva da imunoglobulina A, infere-se que:

- I. O nível sérico de IgA é inferior a 50 µg/ml.
- II. 20% a 30% dos pacientes também apresentam deficiências de subclasses de IgG.
- III. As manifestações clínicas podem variar de pacientes assintomáticos, alterações autoimunes a infecções recorrentes da mucosa.
- IV. A incidência de doença de Crohn e adenocarcinoma gástrico parece estar aumentada.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa que cita o agente etiológico mais frequentemente associado a quadros de infecção crônica do trato gastrointestinal em pacientes portadores de imunodeficiência variável comum.

- A) *Cryptosporidium parvum*.
- B) *Giardia lamblia*.
- C) *Cyclospora cayetanensis*.
- D) *Leishmania donovani*.
- E) *Cystoisospora belli*.

QUESTÃO 13 – Ao exame endoscópico, os xantomas podem ser identificados sob a forma de nódulos ou estrias amarelas pequenas, os quais acometem mais frequentemente a mucosa do:

- A) Esôfago.
- B) Estômago.
- C) Duodeno.
- D) Íleo terminal.
- E) Cólon ascendente.

QUESTÃO 14 – A sarcoidose caracteriza-se por uma resposta imune anormal e formação de granulomas epitelioides não caseosos. No trato digestivo, a sarcoidose predominantemente acomete o:

- A) Esôfago.
- B) Duodeno.
- C) Estômago.
- D) Íleo.
- E) Cólon.

QUESTÃO 15 – A gastroparesia caracteriza-se por retenção alimentar e retardo do esvaziamento gástrico e alterações histopatológicas variadas da camada muscular e está predominantemente associada ao(à):

- A) Diabetes melito.
- B) Amiloidose.
- C) Uso de opioides.
- D) Esclerodermia.
- E) Infecção por citomegalovírus.

QUESTÃO 16 – Em espécimes de biópsia gástrica, a presença de mais de 25 linfócitos por 100 células epiteliais favorece o diagnóstico de gastrite linfocítica. Esse padrão inflamatório usualmente se manifesta como uma pangastrite. É um possível agente etiológico desse quadro inflamatório:

- I. Resposta exacerbada de hipersensibilidade ao *Helicobacter pylori*.
- II. Doença celíaca.
- III. Infecção por HIV.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 17 – O laudo anatomopatológico de um espécime de ressecção de pólipos intestinais cujo diagnóstico correspondeu a adenocarcinoma originado em adenoma tubular com displasia acentuada, com fins de estimar a presença de metástases em linfonodos regionais e em concordância com o colégio americano de patologistas, deve incluir:

- I. Grau de diferenciação e presença de invasão neoplásica angiolinfática.
- II. Presença de invasão neoplásica angiolinfática e grau de invasão da submucosa.
- III. Grau de diferenciação e presença de ulceração.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 18 – Em relação ao tumor de células granulares do trato gastrointestinal, pode-se afirmar que:

- A) Predomina como lesões submucosas no esôfago.
- B) Acomete predominantemente a camada submucosa do estômago.
- C) Exibe expressão uniforme de Sox10 e citoqueratinas.
- D) Exibe expressão uniforme de S100 e citoqueratinas.
- E) Predomina como lesões submucosas S100 positivas do cólon esquerdo.

QUESTÃO 19 – Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao eczema numular.

- A) Trata-se de dermatite aguda e/ou crônica que acomete predominantemente a face extensora das extremidades ou região dorsal.
- B) Histologicamente, pode mimetizar lesões espongióticas.
- C) Em lesões subagudas, a presença de infiltrado linfo-histiocítico perivascular superficial leve e paraceratose é frequente.
- D) O diagnóstico histopatológico não inclui dermatite desidrótica e dermatite atópica.
- E) Frequentemente, são lesões pruríticas e em placas.

QUESTÃO 20 – Qual achado histopatológico abaixo é infrequente em uma biópsia de prurigo nodular?

- A) Hiperortoceratose.
- B) Fibrose dérmica papilar exuberante.
- C) Hipergranulose.
- D) Infiltrado linfocítico perivascular superficial leve.
- E) Acantose com hiperplasia vascular associada.

QUESTÃO 21 – O achado histopatológico predominante da síndrome de Sweet corresponde a:

- A) Infiltrado inflamatório acentuado e rico em células mononucleadas/polimorfonucleares acometendo a derme.
- B) Infiltrado linfo-histiocítico dérmico leve com proeminente vasculite leucocitoclástica.
- C) Infiltrado neutrofílico subepidérmico acentuado e destituído de edema da derme papilar.
- D) Presença de numerosas células mieloides histiocíticas-like acometendo a derme.
- E) Infiltrado neutrofílico acentuado da derme com ausência de pústulas e vesículas.

QUESTÃO 22 – O penfigoide bolhoso predominantemente afeta adultos acima de 60 anos e apresenta, ao estudo por imunofluorescência direta, caracteristicamente deposição:

- A) Granular de C4 na junção dermo-epidérmica da pele perilesional.
- B) Granular intercelular de C3 em toda a espessura da epiderme da pele perilesional.
- C) Linear de IgA na junção dermo-epidérmica da pele perilesional.
- D) Granular de IgM na junção dermo-epidérmica da pele perilesional.
- E) Linear de IgG na junção dermo-epidérmica da pele perilesional.

QUESTÃO 23 – A nefropatia por IgA está comumente associada a quadros de micro hematúria e proteinúria. Qual alternativa abaixo NÃO denota um escore/achado histopatológico presente na classificação de Oxford para avaliação da nefropatia por IgA?

- A) Hiperplasia endocapilar.
- B) Expansão mesangial.
- C) Trombose recente de arteríolas.
- D) Formação de crescentes.
- E) Fibrose intersticial.

QUESTÃO 24 – Na avaliação histopatológica da nefropatia diabética, a presença de esclerose nodular/lesão de Kimmelstiel-Wilson é característica da glomerulopatia classe:

- A) II.
- B) IIa.
- C) IIb.
- D) III.
- E) IV.

QUESTÃO 25 – Qual é a causa mais frequente de síndrome nefrótica em crianças com idade inferior a dez anos?

- A) Glomerulosclerose segmentar e focal.
- B) Doença de lesão mínima.
- C) Glomerulonefrite pós-infecciosa.
- D) Glomerulonefrite membranosa.
- E) Nefropatia por IgA.

QUESTÃO 26 – Assinale a alternativa associada a um quadro de glomerulopatia hereditária relacionada a alterações do colágeno tipo IV em alças capilares glomerulares, hematúria, proteinúria, surdez e anormalidades oculares.

- A) Síndrome de Alport.
- B) Esclerose mesangial difusa.
- C) Síndrome de Pierson.
- D) Síndrome de Denys-Drash.
- E) Síndrome de Frasier.

QUESTÃO 27 – Paciente feminino, 54 anos, apresenta lesão tumoral encefálica extra-axial e circunscrita junto à asa do osso esfenóide. Assinale a alternativa que contém um meningioma de grau histológico 3 segundo a Organização Mundial da Saúde.

- A) Meningioma cordóide.
- B) Meningioma rabdoide.
- C) Meningioma de células claras.
- D) Meningioma secretor.
- E) Meningioma linfoplasmacítico.

QUESTÃO 28 – O astrocitoma subependimário de células gigantes corresponde à neoplasia mais frequente do sistema nervoso central em pacientes portadores de esclerose tuberosa e pode apresentar imunopositividade para:

- I. GFAP.
- II. S100.
- III. NFP (proteína do neurofilamento).
- IV. TTF-1.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 29 – Paciente masculino, 2 anos, com histórico familiar de síndrome de Turcot de tipo 2, foi submetido à ressecção de lesão tumoral cerebelar ovoide, predominantemente circunscrita, medindo 3,2 cm no maior eixo. Qual neoplasia encefálica abaixo está intimamente associada à perda da expressão nuclear de *INI1*?

- A) Meduloblastoma.
- B) Tumor rabdoide / teratoide atípico.
- C) Glioblastoma.
- D) Ependimoma.
- E) Tumor neuroepitelial cribriforme.

QUESTÃO 30 – Assinale a alternativa que cita o tumor neuroendócrino de hipófise associado à imunopositividade do fator de transcrição *TPIT*.

- A) Adenoma somatotrófico densamente granuloso.
- B) Adenoma somatotrófico esparsamente granuloso.
- C) Adenoma tireotrófico.
- D) Adenoma lactotrófico densamente granuloso.
- E) Adenoma corticotrófico densamente granuloso.

QUESTÃO 31 – Em relação às neoplasias do cérebro que acometem a região selar, o tipo histológico com frequente imunopositividade para TTF-1 é:

- I. Tumor de células granulares.
- II. Adenoma hipofisário.
- III. Oncocitoma de células fusiformes.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 32 – Hiperemia e infiltrado inflamatório com predomínio de neutrófilos acometendo a camada muscular são achados histopatológicos característicos de um quadro de apendicite aguda. Qual mediador químico abaixo NÃO está associado ao desenvolvimento de vasodilatação em um processo inflamatório agudo?

- A) Serotonina.
- B) Leucotrienos D₄.
- C) Histamina.
- D) Bradicinina.
- E) Óxido nítrico.

QUESTÃO 33 – Em relação às lesões da glândula tireoide com presença de células de Hürthle, pode-se afirmar que:

- A) As células oncocíticas compreendem aspecto morfológico restrito às lesões hiperplásicas e neoplásicas tireoidianas.
- B) As células oncocíticas apresentam amplo citoplasma eosinofílico, núcleo volumoso e arredondado e ausência de nucléolo evidente.
- C) A maioria das neoplasias de células de Hürthle são lesões parcialmente ou completamente encapsuladas.
- D) A presença de proeminentes atipias celulares, tamanho superior a 2,0 cm, pleomorfismo nuclear e figuras mitóticas frequentes permitem o diagnóstico de neoplasia maligna em lesões sem evidências de invasão extracapsular, extratireoidiana e/ou angiolinfática.
- E) As lesões de células de Hürthle apresentam imunopositividade para ck19 e tireoglobulina e negatividade para TTF-1.

QUESTÃO 34 – Os critérios de Weiss para determinação do diagnóstico de carcinoma adrenal cortical sem padrão oncocítico incluem os seguintes achados, EXCETO:

- A) Número de mitoses acima de cinco em cinquenta campos de grande aumento.
- B) Imunopositividade para inibina.
- C) Presença de invasão neoplásica venosa e sinusoidal.
- D) Presença de necrose.
- E) Alto grau nuclear (graus 3 ou 4 de Fuhrman).

QUESTÃO 35 – Em espécimes de biópsia de medula óssea dentro da normalidade, as células-tronco hematopoéticas apresentam imunopositividade frequente para o anticorpo:

- A) CD34.
- B) CD10.
- C) CD20.
- D) CD3.
- E) CD38.

QUESTÃO 36 – Assinale a alternativa que contém o anticorpo raramente positivo na avaliação imunohistoquímica do linfoma linfoplasmacítico.

- A) CD20.
- B) CD19.
- C) CD10.
- D) CD22.
- E) CD138.

QUESTÃO 37 – Na doença de Gaucher com acometimento esplênico, os achados anatomopatológicos incluem:

- A) Expansão proeminente da polpa branca por histiócitos.
- B) Discreta esplenomegalia.
- C) Histiócitos apresentando citoplasma marcadamente eosinofílico às custas da ausência de glicocerebrosídeos.
- D) Histiócitos com citoplasma grosseiramente granular.
- E) Possível coloração positiva para ferro.

QUESTÃO 38 – Em relação às neoplasias primárias de glândula salivar, o adenocarcinoma polimórfico é predominantemente encontrado no(a):

- A) Glândula submandibular.
- B) Glândula sublingual.
- C) Glândula parótida.
- D) Palato.
- E) Lábio superior.

QUESTÃO 39 – Na doença anti-membrana basal pulmonar, mais de 80% dos pacientes apresentam alterações renais e pulmonares concomitantes, e, frequentemente, apresentam queixa clínica de hemoptise e tosse. Sobre isso, pode-se afirmar que:

- I. A doença anti-membrana basal pulmonar é uma vasculite imunologicamente mediada e está intimamente associada ao tabagismo.
- II. A presença de hemorragia alveolar difusa é a principal alteração histopatológica da doença anti-membrana basal pulmonar, a qual exhibe deposição forte/acentuada de IgG no estudo por imunofluorescência.
- III. O diagnóstico diferencial de doença anti-membrana basal pulmonar inclui granulomatose com poliangeíte e poliangeíte microscópica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 40 – Em espécimes de biópsia, a rejeição hepática aguda ao transplante e mediada por anticorpos pode ser estabelecida inequivocamente pela presença de:

- A) Dano endotelial e edema em espaços porta.
- B) Infiltrado leucocitário portal moderado a acentuado.
- C) Imunoexpressão positiva e difusa para c4d em mais de 50% de veias portais e capilares/sinusoides periportais.
- D) Imunoexpressão positiva difusa para c4d em hepatócitos.
- E) Imunoexpressão positiva para cd4 em linfócitos lobulares.