



ENFERMEIRO

igeduc

80 QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital**; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será ELIMINADO.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
 - Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
 - Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
 - Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
 - Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em concursos.igeduc.org.br.
-

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(de 1 a 60)**

Julgue os itens a seguir.

01. Para as vítimas de trauma penetrante isolado está indicada a restrição de movimento de coluna utilizando-se a aplicação do colar cervical de tamanho apropriado e o restante da coluna estabilizado com prancha rígida.
02. O útero apresenta três partes: o corpo, fundo e colo. O corpo do útero se constitui na maior parte desse órgão e se volta para cima. O fundo do útero se constitui na parede superior do órgão, delimitado pelas emergências das tubas uterinas de cada lado. O colo do útero é o estreitamento inferior do órgão.
03. Não é aconselhado o uso inicial da Ventilação Não-Invasiva (VNI) em pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19 pelo risco de aerossolização, se o ambiente de administração não for um quarto individual com pressão negativa.
04. A contenção mecânica do usuário em crise psiquiátrica ou nos casos de urgência e emergência psiquiátricas somente poderão ser executadas pelo(a) profissional de enfermagem sob supervisão direta da(o) Enfermeira(o).
05. O conceito de período operatório concreto compreende dos 2 aos 6 anos de idade e também é denominado de inteligência verbal ou intuitiva. Esse período é caracterizado pelo desenvolvimento da linguagem de maneira ativa associado à evolução da habilidade motora.
06. Os pacientes com Monkeypox, ainda que assintomáticos, devem realizar o isolamento por 21 dias (quarentena), desde o último contato com outro indivíduo doente. Em caso de contactantes com sintomas sistêmicos e sem lesão cutânea, deve-se considerar o isolamento e a coleta de swab de orofaringe. Caso o paciente que teve contato com um infectado apresente lesões mucocutâneas, deve-se seguir o fluxo para casos suspeitos.
07. A orelha interna é a região onde se encontram os últimos ramos do nervo vestibulococlear. É nesse local que as ondas sonoras são propagadas através de líquidos denominados perilinfa e endolinfa, que estão contidos nos labirintos ósseo e membranoso, respectivamente.
08. Nenhum tratamento atual está disponível para Síndrome da Rubéola Congênita, além do manejo clínico de anormalidades congênitas relacionadas. Embora sintomas específicos possam ser tratados, não há cura para a Síndrome da Rubéola Congênita.
09. A ancilostomíase não se transmite de pessoa a pessoa, porém os indivíduos infectados contaminam o solo durante vários anos, quando não adequadamente tratados.
10. Não existe tratamento específico para as formas crônicas das hepatites virais, exceto para hepatite C. Para as demais hepatites, faz-se apenas tratamento sintomático. Como norma geral, recomenda-se repouso relativo e restrição dietética relacionada ao consumo de álcool.
11. Do lado direito do coração, a valva entre o átrio e ventrículo apresenta três cúspides, sendo chamada de valva tricúspide. Na porção esquerda, a valva atrioventricular esquerda se divide em duas válvulas, sendo denominada de valva bicúspide ou mitral.
12. No momento da inserção do cateter para hipodermóclise, é preciso considerar a direção da drenagem linfática: o cateter deve apontar na direção oposta à drenagem para reduzir o risco de edemas.
13. O rádio é um osso par, longo, localizado medialmente no antebraço e paralelo à ulna. Proximalmente articula-se com o úmero e a ulna (articulação do cotovelo) e distalmente com os ossos carpo (articulação do punho), mais precisamente com o escafoide e o semilunar.
14. A pleura divide-se em pleura pulmonar ou visceral, caracterizada por aderir os pulmões; e pleura parietal, que recobre a face costal do pulmão e está intimamente ligada à caixa torácica. Entre essas paredes, forma-se um espaço preenchido por um líquido, conhecido como líquido pleural, que reduz o atrito entre elas.
15. O consumo de carnes ou outros alimentos de origem animal não é imprescindível para uma alimentação saudável. Porém, a sua restrição requer maior atenção na combinação dos demais alimentos que fazem parte da alimentação, visando à prevenção de deficiências ou quantidades excessivas de outros nutrientes.

16. A Teoria das Relações Humanas preocupa-se com os aspectos psicológicos e sociais do homem no trabalho e tem uma compreensão mais social e humana das entidades. A partir desta teoria, a administração passou a discutir novas variáveis, entre elas a motivação humana, a liderança, a comunicação e a dinâmica de grupo.
17. O Miniexame do Estado Mental (MEEM) possibilita um breve rastreio do comprometimento cognitivo da pessoa idosa com suspeita de demência. É o teste mais utilizado para o diagnóstico, por ser rápido, de fácil aplicação e por permitir orientações quanto ao adequado estímulo às funções cognitivas que ainda encontram-se preservadas.
18. A primeira manifestação clínica da fase aguda pós-postural da esquistossomose é a dermatite cercariana, que decorre da morte das cercárias na pele.
19. A internação deve ser considerada como primeiro recurso diante de situações de urgência/emergência psiquiátrica. É indicado que a equipe da Atenção Primária à Saúde faça contato imediato com os profissionais do Centro de Atenção Psicossocial de referência, a fim de realizar condução conjunta da situação.
20. Durante as visitas domiciliares, o enfermeiro deve identificar, juntamente com a equipe de enfermagem, os problemas e as necessidades do usuário e sua família, visando à realização do processo de enfermagem, assim como traçar um conjunto de medidas e ações que serão realizadas pela equipe multiprofissional.
21. Todas as gestantes infectadas com Monkeypox vírus, independentemente de sintomatologia clínica, apresentam risco aumentado de perda fetal.
22. No ciclo urbano da febre amarela, o ser humano é o principal hospedeiro com importância epidemiológica, e as espécies de mosquitos vetores implicadas na transmissão são do gênero *Aedes*, principalmente o *Ae. aegypti*, mantendo-se um ciclo homem-mosquito. Não há transmissão da febre amarela de pessoa a pessoa.
23. O teste de rotina para diagnóstico da filariose é feito pela pesquisa da microfilaria no sangue periférico, pelo método da gota espessa. A coleta do sangue deve ser realizada entre as 23 horas (noite) e 1 hora (madrugada), devido ao horário em que o parasita se encontra em maior densidade na corrente sanguínea.
24. Recomenda-se a frequência de 7 consultas de puericultura no primeiro ano de vida da criança: na primeira semana, no 1º, 2º, 4º, 6º, 9º e 12º mês. No segundo ano de vida, consultas trimestrais (15º, 18º, 21º e 24º mês), e a partir do segundo ano, consultas anuais.
25. A Sistematização da Assistência de Enfermagem na modalidade Processo de Enfermagem é a metodologia de trabalho do enfermeiro e tem por objetivo a identificação das necessidades do paciente e a apresentação de uma proposta ao seu atendimento, representada pelos planos de cuidados que direcionam a equipe de enfermagem nas suas ações.
26. É proibido ao profissional de enfermagem eximir-se da responsabilidade legal da assistência prestada aos pacientes sob seus cuidados, ainda que realizada por alunos e/ou estagiários sob sua supervisão e/ou orientação.
27. A ligação entre os aminoácidos é denominada de ligação peptídica, sendo a base para a formação de peptídeos e proteínas.
28. Uma das estratégias utilizadas na prevenção da coqueluche é a vacinação de todas as gestantes com a vacina do tipo adulto – dTpa. Essa vacina deverá ser administrada a cada gestação, a partir da 12ª semana. Em gestantes que não foram vacinadas durante a gestação, é necessário aplicar uma dose de dTpa no puerpério o mais precocemente possível.
29. A imunidade adquirida é caracterizada pela especificidade dos linfócitos T e B, pela produção de anticorpos e pelo desenvolvimento da memória imunológica.
30. A duração da poliquimioterapia (PQT) para tratamento da hanseníase é de 12 (doze) doses mensais, tanto para os casos paucibacilares quanto multibacilares.
31. A Escala de Braden é utilizada para medir o risco que o usuário dos serviços de saúde tem de apresentar uma lesão por pressão. Ela é constituída de seis variáveis para avaliação: Percepção Sensorial, Umidade, Atividade, Mobilidade, Nutrição e Fricção/Cisalhamento.
32. A Terapia de Nutrição Parenteral (TNP) pode ser administrada em via periférica se as soluções possuírem uma osmolaridade até 500 mOsm/L. Já o acesso central é indicado para soluções que têm osmolaridade maior que 500 mOsm/L, utilizando-se veia central de grosso calibre e alto fluxo sanguíneo.
33. O período embrionário corresponde ao período em que ocorrem os processos de morfogênese (aquisição de uma forma) e de organogênese (formação dos órgãos). É nessa fase que o indivíduo adquire o aspecto humano e passa a ser denominado embrião.
34. O dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem deve iniciar-se pela quantificação de enfermeiros. Para o tipo de cuidado semi-intensivo, deve-se considerar a proporção mínima de 52% de enfermeiros.
35. A principal característica da enterobíase é o prurido anal, frequentemente noturno, que causa irritabilidade e desconforto. As escoriações provocadas pelo ato de coçar podem resultar em infecções secundárias em torno do ânus, com congestão na região anal, ocasionando inflamação com pontos hemorrágicos.
36. Não há recomendação de quimioprofilaxia para os profissionais de saúde que atenderam casos de doença meningocócica, exceto para aqueles que realizaram procedimentos invasivos sem utilização de equipamento de proteção individual adequado.
37. Os nódulos causados pela oncocercose são imóveis, dolorosos e neles são encontrados os vermes adultos que eliminam as microfírias, as quais, ao se desintegrarem na pele, causam manifestações cutâneas agudas ou crônicas.
38. As penalidades, referentes à advertência verbal, multa e censura são da responsabilidade do Conselho Regional de Enfermagem; as penas de suspensão e de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem.

39. O acesso rápido à reidratação adequada é a base do tratamento da cólera e, em crianças, é importante que a reidratação seja sempre associada à administração de sulfato de zinco.
40. Ao quantitativo estimado de profissionais necessários para a prestação da assistência de enfermagem deverá ser acrescido o índice de segurança técnica (IST) de no mínimo 15% do total, referente às férias e às ausências não previstas.
41. Recomenda-se que, ao administrar as injeções intramusculares, o método do trajeto em Z seja utilizado para minimizar a irritação cutânea local pela vedação do medicamento no tecido muscular.
42. De acordo com o modelo biopsicossocial, o equilíbrio nas relações entre os usuários da saúde será atingido por meio da participação do usuário-paciente nas decisões sobre sua saúde. Nesse contexto, relações saudáveis exigem o respeito aos desejos do usuário e às suas preferências.
43. A vacinação contra febre amarela é a medida mais importante e eficaz para prevenção e controle da doença. Em pessoas de 5 a 59 anos de idade, não vacinadas ou sem comprovante de vacinação, o esquema vacinal consiste na administração de duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.
44. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória, sendo vedado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região.
45. Para a coleta de urina em pacientes que se encontram com cateter vesical de demora, deve-se clampar a sonda próximo ao dispositivo para aspiração e manter o clampamento de 15 a 30 minutos; realizar a desinfecção do dispositivo; aspirar a urina da bolsa coletora com seringa de 20ml; e colocar a urina no frasco coletor com a identificação do paciente.
46. Os ribossomos procarióticos diferem dos eucarióticos no número de proteínas e de moléculas de RNA. Devido a essa diferença, a célula microbiana pode ser morta pelo antibiótico, enquanto a célula do hospedeiro eucariótico permanece intacta.
47. A infecção de sítio cirúrgico incisional profunda acomete órgãos e cavidades manipulados durante a operação e pode ocorrer nos primeiros 30 dias após a cirurgia ou até 12 meses, após a realização de procedimentos de introdução de próteses.
48. A penicilina benzatina pode ser administrada por profissionais de enfermagem no âmbito das Unidades Básicas de Saúde, mediante prescrição médica ou de enfermagem. Os enfermeiros podem prescrever a penicilina benzatina, conforme protocolos estabelecidos pelo ministério da saúde, secretarias estaduais, secretarias municipais, do Distrito Federal ou em rotina aprovada pela instituição de saúde.
49. Quanto à via de administração de medicações para o recém-nascido com indicação de reanimação avançada, a punção intraóssea é o primeiro procedimento de eleição para garantir um acesso venoso central.
50. Os cateteres urinários de luz única são usados para a cateterização intermitente. Os cateteres de luz dupla, usados para a cateterização de demora, têm uma luz para a drenagem urinária e uma segunda luz para se inflar um balão que mantém o cateter no lugar. Os cateteres de luz tripla são usados para a irrigação vesical contínua (IVC) ou nos casos em que se torna necessário instilar medicações na bexiga.
51. Todos os medicamentos apresentam uma meia-vida biológica, que é o tempo que os processos de excreção levam para reduzir a quantidade de medicamento inalterado pela metade. Para modificar a meia-vida de um determinado medicamento, deve-se aumentar a dosagem administrada dele.
52. As pessoas vivendo com HIV em seguimento clínico devem ser triadas para tuberculose em todas as visitas aos serviços de saúde, mediante o questionamento sobre a existência de um dos quatro sintomas: febre, tosse, sudorese noturna e emagrecimento.
53. O Enfermeiro devidamente capacitado pode realizar a inserção, a revisão e a retirada de Dispositivo Intrauterino – DIU. Os dados relacionados ao procedimento deverão ser registrados no prontuário da paciente ou na ficha de atendimento, de forma clara e objetiva, contemplando a descrição do procedimento e as devidas tomadas de decisão.
54. A regionalização das ações e serviços de saúde deve se fundamentar em um trabalho coordenado entre as unidades de saúde de diversos níveis e densidades tecnológicas, permitindo aos usuários uma atenção contínua e integral, abrangendo a promoção, a prevenção, a cura e a reabilitação.
55. Os parasitos podem possuir um único hospedeiro no seu ciclo biológico, sendo denominado assim de ciclo monoxênico. Quando possuem hospedeiro intermediário (um ou mais) e hospedeiro definitivo, o ciclo é denominado heteroxênico.
56. O glucagon é responsável pelo aumento da glicose no sangue, sendo que o principal estímulo para a sua secreção é a hipoglicemia. Uma vez liberado, o glucagon atua sobre os hepatócitos, aumentando a glicogenólise, a gliconeogênese e sobre os adipócitos, aumentando a lipólise. Com essas ações, ocorre uma economia na utilização de glicose, o que favorece a elevação dos níveis glicêmicos.
57. O estômago é um órgão localizado na parte superior do abdome e que apresenta dois esfíncteres, um na entrada, denominado piloro; e outro na saída, denominado cárdia.
58. A osmose é o processo de transporte passivo da água que ocorre a favor do gradiente de concentração. A água movimenta-se de um meio hipertônico para um meio hipotônico, com objetivo de atingir a mesma concentração em ambos os meios (isotônicos), através de uma membrana semipermeável.
59. É dever do profissional de enfermagem abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.

60. No âmbito da epidemiologia, o termo "incidência" indica o número de casos novos de uma doença, por exemplo, ocorridos em um certo período de tempo em uma população específica, enquanto o termo "prevalência" refere-se ao número de casos (novos e velhos) encontrados em uma população definida em um determinado ponto no tempo.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 61 a 80)

Julgue os itens a seguir.

61. O complemento nominal e o objeto indireto são sinônimos.
62. Em uma distribuição normal, a média é igual à mediana.
63. O Professor de Estatística, Ronaldo, decide ensinar os conceitos para sua turma de pós-graduação a partir das idades dos participantes. Assim, verificou a composição das idades e as anotou na seguinte ordem crescente: 26, 28, 30, 32, 32, 34, 36, e 38. Com isso, verificou que a média da amostra foi igual a 31.
64. O time do Star Fox, de futebol, joga 36 partidas durante o campeonato intergaláctico, marcando gols da seguinte forma: 2 gols nas 10 primeiras partidas, 1 gol da vigésima partida até a partida de número 34 e nenhum gol nas demais. Assim, podemos afirmar que a moda dos gols marcados por esse time em todas as partidas do campeonato corresponde a um valor maior que 1 (um).
65. Um aluno obteve as seguintes notas nas oito provas de Física ao longo de um ano: 6,0; 8,0; 6,5; 5,0; 5,5; 7,0; 7,5; 9,0. Podemos afirmar que a mediana desses valores é superior a 6,5.
66. Após aumentos sucessivos do preço da gasolina, a procura pelo álcool combustível aumentou significativamente. Todavia, é preciso lembrar que a composição da gasolina vendida no Brasil segue a Lei 10.203/01, que estabelece percentual entre 20% e 24% de adição de álcool etílico anidro na gasolina. Assim, sabendo que em um posto de gasolina é vendida uma mistura de combustível que possui 20 litros de álcool e 60 litros de gasolina, a porcentagem de álcool em relação à mistura é superior a 31,4%.
67. As idades dos alunos de uma escola, anotadas em ordem aleatória, são representadas pela seguinte sequência: 18, 15, 15, 17, 18, 16, 15, 16, 17, 15. Nesse caso, ela verifica que a média apresenta o mesmo valor da mediana.
68. O acento diferencial é um tipo de acento que serve para diferenciar palavras que possuem a mesma grafia, mas significados diferentes.
69. Advérbios são sempre usados para modificar verbos.
70. Verbos em português não podem ser usados no imperativo negativo.
71. As palavras paroxítonas sempre são acentuadas na penúltima sílaba.
72. Alguns advérbios, como "ainda", podem apresentar mais de uma função sintática na frase, podendo ser utilizado como conjunção ou pronome.
73. A função sintática de um termo pode ser expressa por diferentes elementos, como preposições, pronomes e conjunções. Por exemplo, um complemento nominal pode ser introduzido por uma preposição.
74. Verbos regulares seguem um padrão de conjugação, enquanto os verbos irregulares têm conjugações diferentes e, muitas vezes, irregulares.
75. Segundo a Lei Orgânica do Município de Tupanatinga, os poderes do município são independentes e harmônicos entre si.
76. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Tupanatinga, é vedado ao vereador, desde a posse, exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal.
77. O Município poderá, para fins administrativos, dividir-se em Distritos, segundo a Lei Orgânica do Município de Tupanatinga.
78. Os poderes do Município são dependentes e harmônicos, segundo a Lei Orgânica do Município de Tupanatinga.
79. O Município não poderá, em nenhuma hipótese, se dividir em Distritos para fins administrativos, segundo a Lei Orgânica do Município de Tupanatinga.
80. A Lei Orgânica do Município de Tupanatinga determina que compete à Mesa Diretora da Câmara de Vereadores promulgar a Lei Complementar e suas emendas.

RASCUNHO

PROIBIDO DESTACAR

RASCUNHO