



PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL N.º 02.2023

### 142 – MÉDICO – PEDIATRA

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **40** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME IMEDIATAMENTE AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTES CADERNO SE ENCONTRA COMPLETO E LEGÍVEL. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME IMEDIATAMENTE AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTES CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO, ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

**É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA.**

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.**



insti+u+o  
mais.org.br

O Futuro é nosso Presente

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

Quem começou o ano com a resolução de buscar um maior equilíbrio entre a vida familiar e profissional, iniciou com o pé direito. Um relatório lançado recentemente pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostra a importância de uma melhor conciliação entre trabalho e família, tanto para o mundo do trabalho como para a saúde e vida pessoal. O estudo mostra que mais de um terço de todos os trabalhadores trabalha mais de 48 horas por semana, sendo esta situação mais prevalente na economia informal. Longas jornadas são associadas a uma menor produtividade do trabalho e menor qualidade na relação casa-trabalho. Segundo dados apurados, no Brasil, a média de horas trabalhadas por semana é de 39,5, bem superior à medida dos países da OCDE (37,4 horas semanais). Os trabalhadores por conta própria apresentam jornadas mais longas: em média 45,5 horas.

Se trabalhar muito é um problema, trabalhar pouco também pode significar uma subutilização da mão de obra. Estima-se que cerca de 20% da força de trabalho tenha uma jornada inferior a 35 horas, o que pode indicar a prevalência de empregos parciais e mais precários. Para as empresas, por outro lado, atribuições entre trabalho e família podem trazer impactos negativos sobre os níveis de desempenho, motivação e produtividade, maior ausência no trabalho e problemas de gestão da equipe.

Para os trabalhadores, a falta de equilíbrio entre a vida laboral e pessoal pode levar à deterioração do bem-estar e da saúde mental e emocional, incluindo aumento da ansiedade, estresse, depressão e abuso de substâncias. As medidas adotadas durante a pandemia da Covid-19 produziram novas evidências de que proporcionar aos trabalhadores maior flexibilidade sobre como, onde e quando trabalhar pode ser positivo para trabalhadores e empresas, por exemplo, ao melhorar a produtividade. Por outro lado, restringir a flexibilidade traz custos substanciais, incluindo uma maior rotatividade de pessoal.

Nos países desenvolvidos, o chamado fenômeno da “Grande Demissão” colocou o equilíbrio trabalho-vida pessoal no topo das questões sociais e do mercado de trabalho no pós-pandemia. Nos países em desenvolvimento, caracterizados por altas taxas de informalidade, a maior parte dos trabalhadores não pode sequer considerar essa opção. Se por um lado, a ascensão do trabalho remoto durante a pandemia trouxe maior flexibilidade para a organização do tempo de trabalho, por outro lado fez com que lares se convertessem em ambientes de trabalho. Em princípio, pensávamos que o *home office*\* poderia

trazer oportunidades para passar mais tempo com a família, em razão da diminuição de deslocamentos e flexibilidade de horários. Entretanto, estudos demonstram que, em muitos casos, houve aumento das horas trabalhadas, menor sociabilização, mudança de rotina, prejuízo com respeito ao desenvolvimento de habilidades comportamentais, como a comunicação e a inteligência emocional, além de novos desafios relacionados à Saúde e Segurança no Trabalho (SST).

A fim de amenizar este quadro, é necessário que governos, empresas e sindicatos tenham um papel proativo na promoção de ambientes de trabalho seguro e saudáveis. É fundamental fortalecer os marcos regulatórios sobre o tempo máximo de trabalho e os períodos de descanso. Estas são conquistas que contribuem para a saúde e bem-estar a longo prazo de uma sociedade e não devem ser postas em risco. Atrela-se a essa medida a realização da gestão dos riscos psicossociais no lugar de trabalho, seja na empresa ou no *home office*. É importante que os empregadores implementem medidas institucionais para avaliar e imediatamente mitigar, modificar ou diminuir os riscos para a saúde mental no ambiente de trabalho.

(Jornal O Valor, 20.01.2023. Adaptado).

\*Modalidade de trabalho que possibilita ao indivíduo realizar suas atividades de sua própria casa.

- De acordo com o texto, é correto afirmar que
  - o ideal seria, para solucionar o desgaste dos trabalhadores, uma redução drástica na jornada de trabalho, pois está provado que trabalhar menos que 35 horas semanais potencializa a mão de obra produtiva.
  - os trabalhadores com registro em carteira e todos os direitos assegurados por lei possuem uma jornada maior de trabalho, haja vista estarem mais comprometidos com o desenvolvimento econômico de suas empresas.
  - as relações entre jornada de trabalho e vida privada devem se complementar, uma vez que os impactos sobre a saúde do trabalhador, quando não há a devida proporcionalidade, trazem também impactos sobre as empresas.
  - a possibilidade do trabalho em casa trouxe impactos positivos sobre o meio ambiente, já que diminuiu a emissão de poluentes na camada atmosférica, além do que muitos trabalhadores puderam ampliar seu convívio social.
- Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a colocação pronominal, em conformidade com a norma-padrão da Língua Portuguesa.
  - Quem sociabiliza-se ou interage com a família, tendo que cumprir longas horas de trabalho?
  - Todos os marcos regulatórios impõem-se como necessários para o bem-estar do trabalhador.
  - O trabalho em casa iria conciliar-se com a vida familiar do trabalhador, expectativa esta que não se cumpriu.
  - Quando flexibilizam-se os horários, os trabalhadores conseguem ser mais produtivos.

3. Assinale a alternativa cuja frase emprega palavra com sentido figurado.
- (A) Estas são conquistas que contribuem para a saúde e bem-estar a longo prazo de uma sociedade e não devem ser postas em risco.
  - (B) Nos países em desenvolvimento, caracterizados por altas taxas de informalidade, a maior parte dos trabalhadores não pode sequer considerar essa opção.
  - (C) Em princípio, pensávamos que o *home office* poderia trazer oportunidades para passar mais tempo com a família, em razão da diminuição de deslocamentos e flexibilidade de horários.
  - (D) Quem começou o ano com a resolução de buscar um maior equilíbrio entre a vida familiar e profissional, iniciou com o pé direito.

Analise as frases abaixo para responder à questão 4.

“**Segundo**” dados apurados, no Brasil, a média de horas trabalhadas por semana é de 39,5.

“**Entretanto**”, estudos demonstram que, em muitos casos, houve aumento das horas trabalhadas.

4. É correto afirmar que os termos destacados possuem, respectivamente, o sentido de
- (A) conformidade e contraste.
  - (B) explicação e oposição.
  - (C) proporção e causa.
  - (D) causa e consequência.

5. Assinale a alternativa cuja frase emprega a regência em conformidade com a norma-padrão da Língua Portuguesa.
- (A) Mesmo as empresas pagando os trabalhadores para que realizem suas atividades em casa, a demanda se tornou bem maior.
  - (B) A “Grande Demissão” é ilustrativa da relevância que a equação trabalho e vida pessoal possui em países desenvolvidos.
  - (C) Convém a governos e empresas regulamentar ações pertinentes de horários a fim de não sobrecarregar os trabalhadores.
  - (D) A nova modalidade de trabalho não agradou os trabalhadores, pois eles não conseguiram conciliar suas atividades e família.

#### CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

6. O artigo 61 da Lei Complementar n.º 34/2011 estabelece que o servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade extinta, terá o prazo de
- (A) trinta dias para quitá-lo.
  - (B) noventa dias para quitá-lo.
  - (C) quarenta e cinco dias para quitá-lo.
  - (D) sessenta dias para quitá-lo.
7. Em conformidade com a Lei Complementar n.º 34/2011, assinale a alternativa correta.
- (A) A posse e o início do exercício serão concomitantes, salvo exceções previstas nesta lei.
  - (B) Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo do seu estado.
  - (C) A remuneração do servidor é passível de reduções.
  - (D) Para efeito de cálculo de remuneração mensal dos servidores, o mês será considerado como de quatro semanas.

8. Nos termos da Lei Complementar n.º 34/2011, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O servidor exclusivamente ocupante de cargo em comissão não terá direito aos benefícios do plano de previdência municipal.
- (B) A licença para tratar de interesses particulares poderá ser interrompida antes do fim do prazo solicitado, a pedido da Administração.
- (C) Será negada a licença para tratar de interesses particulares, quando inconveniente ao interesse do serviço.
- (D) As férias regulamentares podem ser usufruídas em períodos não inferiores a quinze dias cada um, sendo o adicional de férias pago proporcionalmente a cada período.

9. É vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções públicas, exceto quando houver compatibilidade de horários em relação a

- I. dois cargos ou empregos de professor.
- II. cargo ou emprego de professor com outro técnico ou científico.
- III. dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

10. A pena de demissão será aplicada ao servidor que, no prazo de \_\_\_\_\_ ano(s), praticar, pela \_\_\_\_\_ vez, conduta apenada com suspensão, tendo recebido esta penalidade na(s) \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) dois / segunda / oportunidade anterior
- (B) dois / quarta / três oportunidades anteriores
- (C) dois / terceira / duas oportunidades anteriores
- (D) três / quarta / três oportunidades anteriores

#### POLÍTICAS DE SAÚDE

11. De acordo com a Lei n.º 8.142/1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal deverão ser destinados, pelo menos \_\_\_\_\_ por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) quarenta
- (B) cinquenta
- (C) sessenta
- (D) setenta

12. De acordo com a Constituição Federal, às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo sistema único de saúde, para o cumprimento dos pisos salariais, cabe, apenas,

- (A) à União.
- (B) ao Município.
- (C) ao Distrito Federal e à União.
- (D) aos Estados e Municípios.

13. De acordo com a Lei Orgânica do SUS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como

- (A) grupos de apoio social, do âmbito federal e estadual para tratar de temas referentes à saúde, com poder de entidade orgânica de fundo privado.
- (B) entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento.
- (C) entidades representativas do ente federal para tratar de temas referentes à saúde e seguridade social com regulamento e subfinanciamento próprio.
- (D) grupo de seguridade social com representação no ambiente federal e com sistema de financiamento proveniente dos entes municipais e estaduais.

14. De acordo com a Lei Orgânica de Saúde, à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros,

- I. planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- II. participar do planejamento, programação e organização da rede centralizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual.
- III. participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

15. Sobre o Plano Diretor de Regionalização (PDR), disposto na Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS (NOAS-SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) A Secretaria de Saúde do estado ou do Distrito Federal deverá encaminhar os produtos à respectiva Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que deverá convocar reunião para análise e aprovação, após, no máximo, 15 (quinze) dias a contar da data de recebimento da proposta.
- (B) Caso não seja homologada pelo Conselho Municipal de Saúde, a referida documentação deverá ser devolvida à respectiva Secretaria Estadual de Saúde, para ajuste e análise das recomendações e novamente submetido à apreciação.
- (C) Aprovado o Plano Diretor de Regionalização e demais produtos, a CIB deverá remetê-la ao Conselho Estadual de Saúde (CES), que terá 30 (trinta) dias para apreciação e deliberação.
- (D) Em caso de alteração do PDR pelo estado ou Distrito Federal após sua homologação pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, deverá ser observada a mesma tramitação definida para a proposta original.

#### CLÍNICA MÉDICA

16. Sobre o(s) antimicrobiano(s) de escolha para *Helicobacter pylori* em conjunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Claritromicina 500 mg + Amoxicilina 1000 mg.
- (B) Claritromicina 500 mg + Amoxicilina 500 mg.
- (C) Amoxicilina 1,5 g + Metronidazol 100 mg.
- (D) Metronidazol 500 mg + Claritromicina 1 g.

17. Sobre a hanseníase, analise as proposições abaixo.

- I. Doença infectocontagiosa, com agente etiológico *Mycobacterium leprae*, sendo um bacilo álcool-ácido.
- II. Infecta os nervos periféricos, em especial as células de Sertoli.
- III. A doença acomete principalmente os nervos superficiais da pele, mas também pode afetar os olhos e órgãos internos.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

18. Paciente Y.P. chega à consulta com diarreia, náuseas e vômitos e câibras musculares. Refere uso de água não encanada próximo a esgoto não canalizado em seu bairro. Optou-se pela coleta simultânea de amostras de fezes para análise viral, bacteriana e parasitológica. O cultivo demonstrou o crescimento de *Vibrio cholerae* (sorogrupos O1 e O139). Portanto, o provável diagnóstico é de

- (A) esquistossomose, bacilo Gram-negativo.
- (B) cólera, bacilo Gram-negativo.
- (C) esquistossomose, bacilo Gram-positivo.
- (D) cólera, bacilo Gram-positivo.

19. Paciente M.S. chega ao consultório com queixa de febre alta > 38 °C há 1 dia, dor por todo o corpo, incluindo articulações, dor atrás dos olhos, perda de apetite e dor de cabeça. A primeira suspeita do quadro é dengue, portanto, para confirmação de diagnóstico agudo, assinale a alternativa que apresenta um exame laboratorial de método direto.

- (A) Antígeno viral NS1.
- (B) Anticorpos da classe IgM.
- (C) Antígeno viral NS3.
- (D) Anticorpos da classe IgG.

20. Sobre o aleitamento materno, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- ( ) O aleitamento materno predominante consiste na oferta de outros tipos de leites além do materno.
- ( ) A OMS e o Ministério da Saúde recomendam aleitamento materno exclusivo por 6 meses.
- ( ) A introdução precoce de alimentos está associada a maiores episódios de diarreia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / F / F
- (B) F / V / V
- (C) V / F / V
- (D) F / V / F

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Para efeito de controle, considera-se que o período de transmissão da coqueluche se estende do quinto dia após a exposição do doente até a \_\_\_\_\_ semana do início das crises paroxísticas (acessos de tosse típicos da doença). Em lactentes menores de 6 meses, pode prolongar-se por até quatro ou seis semanas após o início da tosse.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) primeira
- (B) segunda
- (C) terceira
- (D) quarta

22. De acordo com o Programa Nacional de Imunização, sobre a vacina varicela (atenuada), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Administrar uma dose aos 4 (quatro) anos de idade corresponde à segunda dose da vacina varicela, considerando a dose de tetra viral aos 12 meses de idade.
- (B) Crianças não vacinadas oportunamente aos 4 (quatro) anos de idade poderão ser vacinadas com até 6 (seis) anos 11 meses e 29 dias, incluindo as crianças indígenas nessa faixa etária.
- (C) Em crianças indígenas a partir dos 7 (sete) anos de idade não vacinadas ou sem comprovação vacinal, deve-se administrar 1 (uma) ou duas doses de vacina varicela (atenuada), a depender do laboratório produtor.
- (D) A vacina varicela (atenuada) pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do calendário, incluindo as vacinas tríplice viral e febre amarela.

23. Sobre o sarampo, analise as proposições abaixo.

- I. O período de infecção dura cerca de 7 dias, iniciando-se com período prodromico, quando surge a febre, acompanhada de tosse, coriza, conjuntivite e fotofobia. Do 2º ao 4º dia desse período, surge o exantema, quando se acentuam os sintomas iniciais. O paciente apresenta prostração e lesões características de sarampo (exantema cutâneo maculopapular morbiliforme de coloração vermelha de direção cefalocaudal).
- II. A transmissão ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar, por isso a elevada contagiosidade da doença. Também tem sido descrito o contágio por dispersão de aerossóis com partículas virais no ar, em ambientes fechados, como escolas, creches e clínicas.
- III. O período de incubação pode variar entre 3 e 27 dias, desde a data da exposição até o aparecimento do exantema.

É correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

24. De acordo com o Ministério da Saúde e sobre as recomendações para o não fornecimento do aleitamento materno, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- ( ) Criança portadora de galactosemia, doença rara em que ela não pode ingerir leite humano ou qualquer outro que contenha lactose.
- ( ) Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação. Alguns fármacos são citados como contraindicações absolutas ou relativas ao aleitamento, como os antineoplásicos e radiofármacos, usados no tratamento contra o câncer.
- ( ) Tratamento PQT (Poliqumioterapia) para hanseníase.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
- (B) F / V / F
- (C) V / V / F
- (D) V / F / V

25. Sobre a terapia de reidratação oral para casos de diarreia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) É um tipo de reposição fluida, usado para prevenir e tratar desidratação, especialmente devido à diarreia.
- (B) A terapia de reidratação oral não é indicada por sonda nasogástrica.
- (C) Reposição de água e eletrólitos por via oral, para crianças ou adultos em situações de perdas de grandes volumes de líquidos em curto espaço de tempo realizado em serviços de saúde e no ambiente domiciliar.
- (D) Envolve beber água com quantidades modestas de açúcar e sais, especificamente sódio e potássio.

26. A vacina febre amarela deve ser administrada por via

- (A) subcutânea.
- (B) intradérmica.
- (C) intramuscular.
- (D) oral.

27. Sobre a vacina tríplice viral, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Pessoas de 5 a 29 anos de idade não vacinadas ou com esquema incompleto devem receber ou completar o esquema de duas doses de tríplice viral, conforme situação encontrada, considerando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Considerar vacinada a pessoa que comprovar 3 (três) doses de vacina contendo os componentes sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral ou tetraviral).
- (B) Pessoas de 30 a 59 anos de idade não vacinadas devem receber uma dose de tríplice viral. Considerar vacinada contra o sarampo a pessoa que comprovar 1 (uma) dose de vacina contendo o componente sarampo (monovalente, dupla viral ou tríplice viral).
- (C) Quando houver indicação, a vacina dupla viral (sarampo, rubéola – atenuada) poderá ser utilizada para vacinação de pessoas a partir dos 30 anos de idade ou outras faixas etárias, de acordo com as estratégias definidas pelo Ministério da Saúde.
- (D) Crianças menores de 2 anos de idade que nunca foram vacinadas com as vacinas tríplice viral ou tetra viral ou febre amarela: não administrar simultaneamente as vacinas tríplice viral e febre amarela, devido à possibilidade da diminuição da resposta imune pela vacinação concomitante ou com intervalo inferior a 30 dias.

28. Na infância, os acidentes domésticos são comuns, estando relacionados com faixa etária e condições ambientais. Nas ações de prevenção, o médico pediatra deve considerar que há maior prevalência de acidentes por

- (A) asfixia, entre 3 e 6 anos de idade, porque nesta fase a criança é incapaz de perceber a profundidade espacial e é capaz de abrir portas e janelas.
- (B) afogamento, entre 7 e 10 anos de idade, pois não teme ações motoras perigosas e experimenta novas atividades no meio ambiente.
- (C) intoxicação, entre 2 e 4 meses de idade, porque nesta fase a criança possui coordenação das mãos e olhos, sendo capaz de manipular objetos.
- (D) queimaduras, entre 12 e 36 meses de idade, porque nesta fase a criança é capaz de explorar orifícios, alcançar alturas mais elevadas e puxar objetos.

<p>29. Os reflexos primitivos são respostas automáticas e estereotipadas a um determinado estímulo externo. Estão presentes no nascimento, mas devem ser inibidos ao longo dos primeiros meses, quando surgem os reflexos posturais. Sua presença mostra integridade do sistema nervoso central; entretanto, sua persistência mostra disfunção neurológica. Assinale a alternativa que apresenta o reflexo desencadeado por queda súbita da cabeça, amparada pela mão do examinador e observa-se extensão e abdução dos membros superiores seguida por choro.</p> <p>(A) Reflexo de Moro. (B) Reflexo de busca. (C) Marcha reflexa. (D) Preensão palmar.</p>	<p>35. Nos primeiros 5 minutos das mamadas, o leite materno é composto de</p> <p>(A) água e açúcares. (B) açúcares e lipídeos. (C) água e proteínas. (D) proteínas e açúcares.</p>
<p>30. Quando a criança recebe, além do aleitamento materno predominante, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais, é considerado aleitamento materno</p> <p>(A) exclusivo. (B) misto ou parcial. (C) predominante. (D) ordenhado.</p>	<p>36. O teste do olhinho é um exame simples, rápido e indolor que consiste na identificação de um reflexo</p> <p>(A) vermelho. (B) branco. (C) luminoso. (D) opaco.</p>
<p>31. Durante os dois primeiros anos de vida podem ser detectadas as alterações relacionadas com várias patologias. Por isso, é importante a verificação do peso, da estatura ou altura e do perímetro cefálico. No primeiro ano de vida devem ser realizadas, no mínimo,</p> <p>(A) 4 consultas. (B) 5 consultas. (C) 6 consultas. (D) 7 consultas.</p>	<p>37. São cuidados para evitar a diarreia, desidratação e desnutrição:</p> <p>I. amamentação. II. preparar os alimentos até duas horas antes de oferecê-los ao bebê. III. oferecer alimentos guardados na geladeira até 24 horas.</p> <p>É correto o que se afirma em</p> <p>(A) I e II, apenas. (B) I e III, apenas. (C) II e III, apenas. (D) I, II e III.</p>
<p>32. Levando-se em consideração alguns marcos da maturidade neurológica e marcos do desenvolvimento, a fase em que a criança já sustenta a cabeça, período no qual gosta de ver os rostos da mãe e do pai e gosta que conversem com ela, já começa a levar as mãos à boca, acompanha objetos com o olhar e já se movimenta bastante, é conhecida como</p> <p>(A) cervical. (B) troncular. (C) reptação. (D) deambulação.</p>	<p>38. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta a ser feita em um recém-nascido de mãe HbsAg +.</p> <p>(A) Rastrear o recém-nascido para hepatite B. (B) Realizar o isolamento de contato. (C) Manter os cuidados de rotina, pois o bebê está protegido pelos anticorpos maternos. (D) Administrar imunoglobulina venosa específica de hepatite B e vacina para hepatite B.</p>
<p>33. O teste do pezinho é uma das principais formas de diagnosticar doenças que, quanto mais cedo forem identificadas, melhores são as chances de tratamento. Assinale a alternativa que <b>NÃO</b> apresenta uma dessas doenças.</p> <p>(A) Diabetes tipo I. (B) Deficiência de biotinidase. (C) Doença falciforme. (D) Hipotireoidismo congênito.</p>	<p>39. A respeito da rinite na infância, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) A rinite do lactente e a rinite associada aos resfriados são pouco frequentes na infância. (B) A rinite de origem alérgica é a causa mais comum de respiração oral. (C) É clinicamente caracterizada por obstrução nasal, rinorreia aquosa, espirros e pruridos intensos. (D) A obstrução nasal é causada por edema alérgico das conchas nasais desencadeado pela ação de aeroalérgenos.</p>
<p>34. O departamento de nutrição da sociedade brasileira de pediatria recomenda a suplementação de _____ de vitamina D e _____ de vitamina A por dia, a partir da 3ª semana de vida. Banho de sol pela manhã, até as 10 h, de 10 a 15 minutos pode substituir a suplementação com vitamina D.</p> <p>Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.</p> <p>(A) 100 UI / 1200 UI (B) 300 UI / 1400 UI (C) 400 UI / 1500 UI (D) 500 UI / 1600 UI</p>	<p>40. A respeito da fimose, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) A postectomia deve ser realizada após os 5 anos. (B) O prepúcio pode permanecer aderido à glande até por volta dos 6 meses. (C) A fimose verdadeira é comum e se associa a um anel cicatricial esbranquiçado e não retrátil. (D) Retração prepucial está contraindicada, pois pode levar à parafimose.</p>